

प्रकाशक :

कृषि गो-सेवा विभाग

सर्व-सैवा-संघ

गोपुरी, वर्धा

---

---

( रचयिता द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित )

प्रथम संस्करण  
२०००

मूल्य एक रुपया

सन्  
१९५१

---

---

मुद्रक :

जमनालाल जैन,

व्यवस्थापक

श्रीकृष्ण प्रिण्टिंग वर्क्स, वर्धा

## लेखक का मंतव्य

मेरा आजतक का जीवन देहाती रहा है और पशु मेरे आत्रात्यतः साथी रहे हैं। जब हमारे घर का कोई पशु बीमार होता तो पड़ोस का बृद्ध किसान बुलाया जाता और वह अपनी समझ से कोई दवा कूट-पीस कर उसे खिला-पिला देता पशु ठीक भी हो जाता, तब वह भावना उठी कि हमारे आस-पास उगने वाले इन घास-पत्तों में बड़ा गुण है और प्रकृति कितनी उदार है कि ये चीजें हमें बिना मूल्य इतनी मात्रा में देती है। तभी से इन औषधियों की खोज में लगा। अनुभवी लोगों से जो सीखा, सुना, उसे अनुभवों द्वारा सिद्ध करता रहा। आज मुझे हर्ष है कि जो कुछ भी अनुभव इस दिशा में मुझे प्राप्त हुए वे पाठकों के सन्मुख रख रहा हूँ।

भारतीय पशु-चिकित्सा एक स्वतंत्र शास्त्र रहा है जो पुरातन महर्षियों द्वारा प्रतिपादित हुआ और आधुनिकता और पाश्चात्य पद्धति के आवरण में विलुप्त ही हो गया है। जो कुछ थोड़े-बहुत अनुभव द्वारा प्राप्त हुये नुस्खे व्यक्तियों में परंपरा से चले आते हैं वे भी अत्यंत संकुचित मनोवृत्ति के कारण उनके जीवन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यह देखने में आया है कि लोग अपने वंशजों को भी यह ज्ञान वितरण करने में संकोच करते हैं। ऐसी मनोवृत्तियों के कारण लेखक को भी अत्यंत कठिनाई होती रही है। आचार्य श्री. चन्द्रिकाप्रसाद पांडेय की प्रेरणा के अतिरिक्त उपर्युक्त अष्ट-मनोवृत्तिने भी इस प्रकाशन में मुझे प्रेरणा दी है।

इस प्रकाशन में उन उपचारों को ही स्थान दिया गया है जिनका पूरा अनुभव पशुओं पर किया जा चुका है और उन ही रोगों पर विशेष विचार किया गया है जो साधारणतया इस देश के पशुओं में हुआ करते हैं।

रोगों की संक्रामकता के बारे में मेरे विचार कुछ निजी हैं जिनके कारण मैं इनपर विशेष ध्यान नहीं देता। क्योंकि, देखने में आ रहा है

कि पाश्चात्य पद्धति के अनुयायी छूत से दूर रहने और रुग्ण पशुओं को आपस में न मिलने देने के पक्ष में रहते आये हैं। वे ही हताश होकर कहते हैं कि (फुट एण्ड माऊ) मूँह-खूरी की बीमारी में बीमार पशु की लार कुल पशु-समूह को लगा देना चाहिये ताकि सब पशु एक ही बार रोगी हो जायँ। जो कुछ होना हो सो हो जाय।

कितनी विवशता है ! कितनी निराशापूर्ण स्थिति !! कितना जोखिम का तरीका !!!

विचारने का विषय है, जिस चीज से इतने दूर भागते हैं—मौत का सा डर दिखता है, फिर उसी चीज को चलाकर पशुओं में फैलाने की कोशिश। कितना भयंकर परस्पर विरोधी विज्ञान है ! यदि हर पशु को दूर रखकर बचाना सम्भव है तो इतना भय क्यों ? और यदि इतना सब कुछ करने पर भी सम्भव नहीं तो, स्वयं चलाकर रोग को निमंत्रण देने का क्या अर्थ है ?

कहा जाता है कि अमेरिका आदि देशों ने 'रीडरपेस्ट' (माता) से छुटकारा पा लिया है। वहाँ जव जव यह रोग पशुओं में आया, उनको मार दिया गया ताकि रोग अन्य पशुओं में न फैले। उन्होंने यह मान लिया है कि इस रोग में मृत्यु संख्या शत प्रतिशत होती है। हमारे यहाँ इस रोग में मृतसंख्या केवल ५० से ६० प्रतिशत बताई जाती है। यदि ऐसे तरीके हमने भी अपनाये तो जो बचने की सम्भावना हो वह भी नष्ट हो जायगी। ऐसा न करके हमें तो केवल प्रकृति के सेवक की तरह कार्य करना है। प्रकृति की सारी जिम्मेदारी अपने पर ही ले लेना हमारी भारी भूल है। वास्तविकता यह है कि जैसे उपदेश पाश्चात्यों द्वारा हमारे पास आते हैं वे न तो अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल हैं और न भारतीय संस्कृति से मेल ही खाते हैं।

एन्ग्रेस आदि संक्रामक मानी जानेवाली बीमारियों में 'सीरम' और 'वायरस' के उपचार पर ही निर्भर रहना हमारी भूल है। एक तो स्वतः यह एक हिंसात्मक प्रक्रिया है। परन्तु "एक के द्वारा अनेक का हित" इस रीति से साधन होता है, अवश्य। किन्तु, विशेषज्ञ स्वयं मानते हैं कि 'सीरम' आदि का असर अस्थायी और क्षणिक होता और रोग से बचा रखने के लिए पशुओं को बार बार टीका देते रहना पड़ता है। इस तरह स्थायी इलाज तो नहीं हुआ।

इस पद्धति की प्रक्रिया को सुनकर आप को आश्चर्य होगा। किसी निरोग पशु के रक्त में रोगी पशु के रक्त को प्रवेश किया जाता है और फिर वह रोग उस पशु को उत्पन्न होने पर वापस उसका रक्त निकालकर अन्य पशुओं में "रोग प्रतिरोधक शक्ति" उत्पन्न रहने के लिए प्रवेश करा दिया जाता है। इस में बहुत बड़ी जोखिम यह है कि कितने ही अन्य रक्त रोग बाहर से आकर प्रवेश करते हैं। "गये थे रोजे छोड़ने और नमाज गले बंधी" वाली बात चरितार्थ होती है। मेरे विनम्र विचार में ऐसी "प्रतिरोधक शक्ति" का अर्थ ऐसा है जैसे बाहर के गुंडों के आतंक से बचने के लिए अपने घर में पहिले से कुछ और गुंडे लाकर उनके द्वारा बचाव की उम्मीद करना।

इसके अतिरिक्त जब पशु में प्रतिवर्ष बार बार किसी न किसी रोग के लिये 'सीरम' 'वायरस' प्रयोग चलता ही रहेगा तो उसकी नैसर्गिक "प्रतिरोधक शक्ति" शनैः शनैः नष्ट होगी। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में पशु "रींडरपेस्ट" आदि रोगों में ही नहीं बल्कि "मुँह खुरी" में जिसकी अपने देश में पर्वाह तक नहीं की जाती, तुरन्त मर जाते हैं।

हमें नैसर्गिक उपचारों पर ही विशेष ध्यान देना है और प्रकृति ने अटूट भण्डार जो वनस्पतियों के रूप में हमें दिया हुआ है उसी से लाभ उठाना है। आवश्यकता है खोज की। शताब्दियों का आवरण हमारे

दृष्टिकोण पर आया हुआ है और हम इतने परावलम्बी हो चुके हैं कि साधारण चीज के लिये भी बाहर मुँह ताकते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यहाँ उन रोगों पर ही विचार किया है जो साधारणतया हमारे पशुओं में होते हैं और जिनके लक्षण हमारे देहाती भाई खूब पहिचानते हैं। सरलता की दृष्टि से अन्य पुस्तकों की भाँति रोग के कारण आदि शास्त्रीय विवेचन के प्रपंच में मैं नहीं पड़ा हूँ। दृष्टिकोण यही रहा है कि इन-इन रोगों पर ये-ये उपचार खूब अनुभव सिद्ध हैं जिनका प्रयोग गाँवों में यदि किया गया तो काफी लाभ होगा ऐसी आशा है।

मेरा निजी विश्वास तो 'टोटकों' आदि पर भी रहा है और अनुभवने प्रमाणित भी किया है। कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं किये जाने पर भी विश्वास के आधार पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। हानि तो होने वाली ही नहीं है, कुछ लाभ ही होगा।

राजस्थानी भाई श्री भगवानदासजी जोशी (सुवाणा) के परिश्रम द्वारा इन उपचारों, दवाइयों तथा उनके उपयोगों को एक सूत्र में संकलित किया है। मैं कह सकता हूँ ऐसे श्रम बिना यह कार्य इतना सुगम नहीं हो सकता था। इनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ। इसी प्रकार गोप विद्यालय, गोपुरी के आचार्य श्री. चन्द्रिकाप्रसादजी पाण्डेय ने समय समय पर इस संकलन को संशोधित किया इनका भी मैं आभारी हूँ।

यद्यपि यह पुस्तिका इस विषय पर सम्पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकती तथापि यदि देहाती पशुओं को जहाँ और कोई उपचार सुलभ नहीं होते उन्हें लाभ पहुँचा तो मैं अपने को कृतार्थ मानूँगा।

पिपरी

६।१२।५१

— गो-सेवक रामगोपाल पटेल

## दो शब्द

आज दुनिया में चिकित्सा की अनेक पद्धतियां चल रही हैं। इस जमाने में अलोपैथी ने बहुत उन्नति की है और बड़े से बड़े शास्त्रज्ञ और आज की सभी सरकारें इसके पीछे पूरी शक्ति खर्च कर रही हैं। जिन देशों में इस पद्धति का विकास हुआ है उन देशों का उत्पादन भारत के मुकाबले काफी अधिक है। इस पद्धति का उन देशों ने बहुत लाभ उठाया है। फिर भी हमारे देश में इसकी अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। कुछ शहरों तक ही वह सीमित है। इसका मुख्य कारण पद्धति का खर्चालापन है। हमारे किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वह अपने खुद के लिये भी इस चिकित्सा का लाभ नहीं ले सकता। तब फिर पशुओं का सवाल ही नहीं उठता। हमारे किसान के पशुओं को उसी पद्धति से लाभ पहुंच सकता है जिसका ज्ञान और खर्चा उसके बूते के बाहर न हो। हमारी देशी चिकित्सा पद्धति दोनों बातों में किसान के अनुकूल है। इसका ज्ञान भी किसान को आसानी से हो सकता है और खर्चा भी बहुत कम लगता है सिवाय बहुत-सी चीजें आसपास ही मिल जाती हों। किसी दूसरे देश पर अवलंबित्व भी नहीं रहना पड़ता। इस सब दृष्टि से किसान के हित में एक मात्र देशी चिकित्सा पद्धति ही लाभदायी होगी ऐसा हमारा ख्याल है।

अलोपैथीकी जो कुछ दवाइयां किसान के बूते में होंगी उनका भी उपयोग करेंगे। किसी भी पद्धति का निषेध नहीं है। फिर भी इस देशी पशु चिकित्सा को ही अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का संघने तय किया है। हमारा विश्वास है कि आज भी इस देशी चिकित्सा में काफी शक्ति मौजूद है। इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय तो यह बड़ी लाभदायी बन सकती है।

देशी चिकित्सा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हम यहां दो तीन साल से प्रयोग कर रहे हैं। इंदौर निवासी पशु वैद्य श्री राम गोपाल कुलमी की सेवाओं हमें इस काम के लिये मिली हैं। इतने दिनों के अनुभव से हमने देखा कि पशुवैद्य रामगोपाल अच्छे अनुभवी हैं और देशी चिकित्सा से सब तरह का इलाज काफी अच्छे तौर से कर सकते हैं। खास तौर से मुंहखुरी, पैरखुरी, मोरकीड़ा, गलघोंटु, हड्डीका टूटना, किसी भी तरह के जहम आदि बीमारियोंका इलाज विशेष हुआ है।

यहां जो अनुभव आये उनका सार और पशुवैद्य रामगोपाल के स्वतः अनुभवों का सार जनता के हितके लिए यहां दिया गया है। आशा है इससे जनता लाभ उठावेगी।

विशेष रूपसे जो भाई प्रत्यक्ष वर्धा में आकर इस विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहें उनके लिये बिना खर्च शिक्षा की सुविधा की जा सकेगी। आने के पूर्व संघ की अनुमति ले लेनी चाहिये।

वर्धा,  
१।१२।५१ }

राधाकृष्ण वजाज

मंत्री

अ. भा. सर्व-सेवा-संघ  
कृषि गो-सेवा विभाग

# विषय सूची

विषय	पृष्ठ
१. शीतला या माता	१
२. शोथ ज्वर	४
३. गलघोटू	५
४. मुंहखुरी	७
५. कीड़े पड़ना	९
६. खुर का तिड़क जाना	९
७. मस्सा होना	१०
८. गर्भपात	१०
९. धनुर्वात	११
१०. जहरवात या जहरी बुखार	१२
११. खुजली	१३
१२. दाद ( खोड़ा )	१५
१३. पेट फूलना ( आफरा )	१६
१४. पेट का दर्द	१७
१५. मुंह में के कांटे बढ़ना	१८
१६. दस्त लगना	१९
१७. शीत-पित्त या पित्ती उछलना	२०
१८. अपचन	२१
१९. पेट में कीड़े पड़ना	२२
२०. पेचिश	२४
२१. जुकाम	२५
२२. खांसी	२५
२३. निमोनिया	२६
२४. दमा	२९
२५. गर्मी के दमा	२९
२६. सर्दी के दमा	२९



२७. पेशाब में खून आना	३०
२८. पेशाब का रुक जाना	३१
२९. सांड के फोतों का सूज जाना	३२
३०. मिरगी	३३
३१. बुखार	३४
३२. बिल्ट	३६
३३. गठिया या जोड़ों का दर्द	३७
३४. वच्चा गिरा देना	३८
३५. जेर न गिरना	३९
३६. स्तनों का सूज जाना	४१
३७. वच्चेदानी का बाहर निकल आना	४२
३८. गाय का गर्भ धारण न करना	४४
३९. गाय का बार बार गाभिन होना	४५
४०. हड्डी पर चोट लगना और टूट जाना	४६
४१. हड्डी टूट कर बाहर आ जाना	५०
४२. हड्डी का जोड़ से सरकना या मोच आना	५१
४३. दागना	५३
४४. झटका लगना	५४
४५. पसली टूट जाना	५६
४६. कमर का टूट जाना	५७
४७. खुरमोच या खुर तिड़क	५८
४८. आगे के पैर की ढाकणी खिसक जाना	५८
४९. सींग का टूट जाना	५८
५०. कमेडी (कैंसर)	५९
५१. कठामी (ट्यूमर)	६१
५२. आंख का फूला	६२
५३. आंख में जाला	६४
५४. रक्त प्रदर	६४

५५. सूर की बीमारी	६५
५६. डेंडकी रोग	६६
५७. हल रोग	६७
५८. पटाड़ी रोग	६७
५९. कन्धे में गांठ होना	६९
६०. कन्धा तिड़कना	७०
६१. हाथी पगा	७०
६२. जानवर का अकड़ जाना	७०
६३. स्तन फटना	७१
६४. स्तनों में फुन्सियां	७१
६५. हिया त्रिलाय	७२
६६. तिड़ रोग	७३
६७. दुग्ध पीते बच्चों को दस्त लगाना	७४
६८. फांसी या छड़ रोग	७५
६९. आंख का कोया निकलना	७६
७०. पागल कुत्ते या सियार का काट खाना	७७
७१. जानवरों को रतौंधी का आना	७७
७२. पूंछ का बांड़ी रोग	७८
७३. कमजोर सांड को बलवान बनाना	७८
७४. गर्म पानी से जल जाना	७९
७५. आग से जल जाना	७९
७६. जानवर के नजर लग जाना	७९
७७. माता का अपने बच्चे को भूल जाना	८०
७८. सांप का काट खाना	८१
७९. शेर का जानवर को पकड़ लेना	८२
८०. बर्र, मंवर या मधुमक्खी का काट खाना	८२
८१. जानवर का दूध बढ़ाने के इलाज	८३
८२. जखम को पकाना	८३

८३. जुएं मारना	८४
८४. बत्तीसा चूर्ण	८४
८५. नाखूर	८६
८६. जानवर के कीड़े पड़ जाने पर	८६
८७. जानवर का एकदम अंधा हो जाना	८६
८८. जुलाव	८६
८९. बच्चे के मरने पर दूध का न देना	८७
९०. आलू के पत्ते खाने पर विष	८८
९१. अलासिया बरू या ज्वार की जड़ या पौधे का विष या खेजड़ा	
फली का तिल	८८
९२. सर्प की कैंचुली खाने का विष	८८
९३. गर्दन तोड़	८९
९४. सन्निपात का इलाज	८९
९५. सींग का खोखला निकलना	९०
९६. चमारी पड़ने का इलाज	९०
९७. स्तन से खून आना	९१
९८. आर पिरानी आदि से नस में छेद होना	९१
९९. आंख में चर्मिया पड़ जाना	९२
१००. जीभ पर छाले पड़ जाना	९२
१०१. बांझपन दूर करना	९२
१०२. लोहा खा जाने पर	९३
१०३. पांव की करवान का इलाज	९३
१०४. अनुक्रमणिका—	
(अ) कुछ रोगों की नामावली	९४
(ब) कुछ दवाइयों की नामावली	९९
१०५. कुछ रोग तथा उनके उपचारोपयोगी औषधियाँ	१०१

# पशुओं की सिद्ध वनौषधि चिकित्सा

[ “भारतीय पशु चिकित्सा शास्त्र” ]

## शीतला या माता

केवल जुगाली करने वाले जानवरों पर ही इस रोग का आक्रमण होता है। रोग के लगते ही १-६ दिन में यह रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है।

### लक्षण

रोग लगने पर प्रथम शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बुखार ४-५ डिग्री तक बढ़ जाता है। शरीर में फुन्सियों के निकलने पर गर्मी घटने लगती है। नाड़ी की गति बढ़ जाती है। इस रोग की चार अवस्थाएँ होती हैं :—

पहली अवस्था :— पहली अवस्था में जानवर का शरीर गर्म हो जाता है। मुख की श्लेष्मिक झिल्ली के रक्त संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगती है। जानवर को खाँसी चलती है, शरीर-काँपन होती है, गोबर कफ-युक्त होता है। भूख कम लगने लगती है। जानवर बार बार अपने दाँत पीसता है और शरीर के रोयें खड़े हो जाते हैं।

दूसरी अवस्था :— श्वास जोर जोर से चलने लगता है। खाना पीना और जुगाली करना बन्द हो जाता है। आँखों में गीढ़ (मैल) धार धार आता है। जानवर के मुँह में गालों की झिल्ली लाल हो जाती है। जिव्हा पर छाले उत्पन्न हो जाते हैं। गोबर पतला होता है। गोबर होते समय जानवर काँखता है।

**तीसरी अवस्था:—** मुँह छालों से भर जाता है। खाना-पीना, जुगाली करना कतई वन्द हो जाता है। गोबर बहुत ही पतला होता है। गोबर में से दुर्गन्ध निकलती है। नेत्रों में से, श्वेत श्वेत रंग के विपैले पदार्थ के निकलने के कारण नेत्रों के आस-पास की खाल उड़ जाती है। मुँह में छाले होने से मुँह से लगातार लार गिरती है। छाले एक दूसरे से मिलकर फोड़े का रूप धारण कर लेते हैं। इस अवस्था में अक्सर गामिन जानवरों में गर्भपात हो जाता है। गोबर रक्तमिश्रित और बहुत ही पतला होता है।

**चौथी अवस्था:—** इस अवस्था में जानवर को निरन्तर खून के दस्त लगते हैं। जानवर अत्यन्त अशक्त बन जाता है। मालिक की लापरवाही के कारण सींग की जड़ों, मुँह, कान, नेत्र और पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं। इस अवस्था में पहुँचने पर जानवर बहुत जल्दी मर जाता है।

## चिकित्सा

(१) हस्तीशुण्डी पूरा पौधा १ तोला  
पानी ३ छटांक

प्रथम हस्तीशुण्डी को बारीक बांट कर उसे पानी में मिलाकर रोगी जानवर को पिला देना चाहिए। यह दवाई उपर्युक्त मात्रा में सुबह शाम दोनों समय जानवर को पिलाना चाहिए। यह दवाई पिलाने ही दस्त बन्द होने लग जाते हैं। जानवर को अगर “आफरा” होता है तो उतर जाता है। जानवर के स्वस्थ होने तक यह औषधि रोगी को बराबर पिलाते रहना चाहिए।

हस्तीशुण्डी अक्सर तालाब, नदी एवं नालों में होती है। यह पौधा भूमि पर छतरी के सदृश फैलता है। इसके छोटे छोटे श्वेत फूल आते हैं। यह पौधा अक्सर अगहन माह में उत्पन्न होता है और वर्षा

ऋतु आते ही नष्ट हो जाता है। फल निकल आने पर इसकी बहुत जल्दी पहिचान होती है। हस्तीशुण्डी छांह में सुखाकर जरूरत के वक्त काम में लाई जा सकती है।

(२) जानवर के खाना-पीना और जुंगली करना बन्द करने पर और झूँह में छाले हो जाने पर उसको प्रतिदिन सुबह-शाम एक-एक छटांक की मात्रा में अलसी का तेल पिलाना चाहिए। इससे छालों के आराम होने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

(३) रक्त मिश्रित दस्त लगने पर—

बेल फल का गूदा	१० तोला
ज्वार का आटा	८० तोला
पानी	१६० तोला

सबको मिलाकर इसी मात्रा में दिनमें २ बार देना। बेल फल के गुदे को बारीक पीस छान कर देना चाहिए। इस दवाई से रक्त मिश्रित दस्त बन्द हो जायेंगे।

(४) अरणी की पत्ती का रस ५ तोला या  
नीम की पत्तियों का रस ५ तोला

रोगी जानवर को पिलाना चाहिए। इससे अन्दर की गर्मी शान्त हो जायगी। छालों में सुधार होगा। प्यास मिट जायगी और दस्त बन्द होंगे।

इसके अलावा जानवर को हल्की, पतली और पोपक खुराक देना चाहिए। इसके लिये चाँवल का माण्ड, अलसी की पेज आदि काममें लाना चाहिए। रोगी जानवरों को निरोगियों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। मरे हुए जानवर की चमड़ी भूल कर भी नहीं निकलवाना चाहिए। इस रोग से जो जानवर मर जाय उसको ५-६ फीट गहरा

गड्ढा खोद उसमें चूना डाल गाड़ देना चाहिए। रोगी जानवर का टट्टी-पेशाब इधर उधर कमी नहीं फेंकना चाहिए बल्कि गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए।

(५) सुई नीम की या टेमरुन (टीमरु) की गुंद की धुनी देना।

(६) दमना की पत्ती ३ तोला } पीसकर पानी के साथ देना।  
पानी २० ”

(७) सूखी हुई उखड़णी का जीव (सावूत नदी की सीप का जीव) पानी में धोलकर पिलाना चाहिए।

(८) तीसरी अवस्था में जानवर को पतला खूनी दस्त बढ़ जाय तो :-

रान बटाना (समूचा पौधा) ५ तोला

पानी ४० ”

पिला देना चाहिए।

(९) शीशम की पत्ती २० तोला

पानी ३० ”

पीस कर तथा मिला कर पिला देना चाहिए।

(१०) दागः— पानी की कूख में ६ इंची आड़े दाग लगा दें।

(११) माता निकलने पर गूगल की धूनी दें।

## शोथ-ज्वर

### कारण

जंगल तथा पहाड़ी पर प्रथम बार जत्र वर्षा होती है तो उसका पानी पत्थर आदि कई जगह चुलकर इकट्ठा हो जाता है जिसके पीने से यह रोग हो जाता है। खास कर कम उम्र के पशुओं को यह अधिक होता है।

## लक्षण

जानवर सुस्त होता है। छुण्ड के सब जानवरों से अलग खड़ा रहता है। चलते हुए जानवरों में सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। चारों पैरों से जहाँ लंगड़ाता है वहाँ सूजन दिखाई देती है। सूजन को दबाने से “चर चर” आवाज़ आती है। जानवर जल्दी जल्दी श्वास लेता है, तेज ज्वर भी होता है। जानवर दौत पीसता है। अक्सर २४ घण्टे में जानवर मर जाता है।

## इलाज

१. कांस के फूल २० तोला  
पानी ८० तोला

कांस के फूलों को बारीक पीस पानी में मिला रोगी जानवर को पिलाना चाहिए। इस प्रकार इसी मात्रा में दिन में ३-४ बार पिलाना चाहिए।

२. तेन्दू फल एक पूरा फल हलदी ५ तोला  
सत्यानाशी ५ तोला छाछ १२० तोला  
आपामार्ग (ओंगा) अतिझाड़ा ५ तोला

इन सब को बारीक पीस दिन में तीन बार पिलाना चाहिए।

## खान-पान

जानवर को हलकी, पतली और पोषक खुराक देना चाहिए।

मुलायम घास एवं चॉवल का माण्ड आदि खाने में देना चाहिए। रोगी को अन्य जानवरों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए।

## गलघोटू

कारण—यह एक रक्त-विकार की बीमारी है। नौजवान जानवरों में यह रोग अधिक होता है। जो जानवर नदी नालों की तराइयों में पैदा हुई सड़ी गली घास खा जाते हैं उनको यह रोग जल्दी होता है।



## लक्षण

जानवर अत्यन्त सुस्त दिखाई देता है। जानवर को तेज प्वर होता है। जो कभी कभी ६ से ८ डिग्री तक पहुँच जाता है। गले पर बहुत सख्त प्रकार की सूजन होती है। सूजन दवाने पर भी नहीं दबती है और दवाने पर जानवर को बहुत अधिक दर्द होता है। कभी कभी तो सूजन को स्पर्श करने से ऐसा लगता है जैसे जानवर के गले में कोई सख्त प्रकार की वस्तु अटक गई है। जानवर बहुत जोर का खरटेदार श्वास लेता है जो बहुत दूर से ही सुनाई देता है। इस प्रकार दम घुटघुट कर एक दो दिन में जानवर मर जाता है।

## इलाज

१. कांस के फूल ५ तोला

पानी ४० तोला

कांस के फूलों को बारीक पीस छानकर पानी में मिला रोगी को पिलाना चाहिए। इसी प्रकार इसी मात्रा में दिन में ३-४ बार पिलाना चाहिए।

२. तेन्दूफल १ फल

सत्सानाशी ५ तोला

अतिझाड़ा या आंधीझाड़ा ५ तोला

हलदी ५ तोला

छाँछ १२० तोला

इन सब को बारीक पीसकर पानी के साथ ब्रीमार को पिलाना चाहिए।

३. दागना:—गले पर जहाँ सूजन हो वहाँ इस प्रकार का “X” लोहे को गर्म करके दाग लगाना चाहिए। दाग अधिक गहरे हो

लगाना चाहिए। दाग लगाने के लिए दाँतली-हंसिया या इसी प्रकार का कोई भी औजार उपयोग में लाया जा सकता है।

## खान-पान एवं सूचनाएं

इस बीमारी में भी वे सब सावधानियां बरती जानी चाहिए जो माता, शोथ-ध्वर आदि में बरती जाती हैं।

रोगी को अगर निम्न लिखित वस्तुएं खिलाई जाँय तो उनसे भी फायदा हो सकता है।

१. पानी में का आगिया लाकर आटे में मिला जानवर को खिलाना।

२. अरण्डी का तेल १ पाव और भिलावे २१ बारीक कूट गर्म करना और छानकर जानवर को पिलाना।

३. खेजड़े के ऊपर का बांधा ४० तोला।

पानी १२० तोला।

दोनों को उबालना। पानी जब ६० तोला रह जाय तब उतार लेना और कुनकुना जानवर को पिला देना। तथा उबली हुई पत्ती दर्द के ऊपर बांध देना।

## मुँह-खुरी

### कारण

सब से अधिक फैलने वाली यह एक बीमारी है। इसके जानवर मरते तो कम हैं, परन्तु कष्ट बहुत पाते हैं।

### लक्षण

प्रारम्भ में जानवर सुस्त दिखाई देता है। मुँह से निरन्तर लार गिरती रहती है। जानवर खाना-पीना बन्द कर देते हैं। दूध देने वाले

जानवर दूध कम देने लगते हैं। चूँकि यह रोग मुँह और खुर दोनों में होता है, इसलिये जानवर लंगड़ाता भी है। मुँह में—पूरे मुँह में छालों का पैदा हो जाना इस की खास पहिचान है। खुरों में जलम हो जाते हैं। मुँह के छाले फट कर एक दूसरे से मिल जाते हैं। शुरू में जानवर को ज्वर भी होता है जो बाद में कुछ कम हो जाता है।

### इलाज

(१) हाँग ८ माशा

सरसों का तेल २० तोला

रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही हाँग और सरसों का तेल मिलाकर सब जानवरों को पिलाना चाहिये।

नोट:—गौशाला में खरगोश पाला जावे तो यह बीमारी नहीं आवेगी। यदि आ भी जावे तो उस खरगोश के कुछ बाल काटकर उस की धूनी दे देने से दूर हो जावेगी।

(२) आक का दुग्ध (आकड़ा या मदार, चई)

अलसी का तेल

कीमिया सिन्दूर

तीनों को जानवरों के हिसाब से मिलाकर रविवार के दिन प्रातः काल ३ बजे ही जानवरों की पीट पर (क्रम से ४ अँगुल आगे)। यानी मकड़ी पर सलाई से एक-एक टीकी लगाना चाहिये।

२५ जानवरों के लिये १ तोला आक का दुग्ध, २ तोला सिन्दूर और ५ तोला तेल पर्याप्त है।

(४) कई लोग नीचे लिखा टोना भी कहते हैं, जिन को विश्वास हो वे प्रत्यक्ष कर के देखें:—

रविवार के दिन रात को ३ बजे ही लाल कपड़े में सब जानवरों का १ सेर गोबर तोल लेना। तेल सिन्दूर को प्रथम मिला लेना और उसमें

ओसीझाड़ा की जड़ को भीगो लेना । सिन्दूर से भीगी ओसीझाड़ा की जड़को १। सेर गोबर में दबाकर के लाल कपड़े में बांध रातको ही जहां घर के सब जानवर निकलते हों, लटका देना ।

इसके अलावा जानवर को प्रति दिन अलसी का तेल पिलाते रहना चाहिये । इससे छाले बहुत जलदी अच्छे हो जाते हैं ।

### कीड़े पड़ना

इस रोग में अक्सर जानवर के मुँह एवं खुरों के बीच कीड़े पड़ जाया करते हैं । इसके लिये निम्नलिखित उपाय काम में लाना चाहिये ।

(१) जहरी कौन्चला ३

अलसी-तेल ४० तोला

दोनों को मिला गर्म कर जहां कीड़े पड़ गये हों वहाँ लगाना ।

(२) करौंदा की जड़

खोपरे का तेल

जड़ को बारीक पीस तेल में मिला कर लगाने से कीड़े मर जायेंगे ।

(३) खटामा की जड़ बारीक पीस कर जखम पर डालना । कीड़े बाहर निकल आयेंगे ।

(४) दिकामाली और खोपरे का तेल मिलाकर लगाना । इस से जखम पर मक्खियां नहीं बैठेंगी ।

(५) फिटकरी और लकड़ी के कोयलों का पाउडर घाव में भरना ।

(६) बड़ी लाजनी ३० तोला लेकर आटे में मिलाना और जानवर को खिलाना । इस से कीड़े मर जाते हैं ।

### खुर का तिडक जाना

इस रोग में अक्सर जानवर के अच्छे होने के पश्चात् या पूर्व जानवरों के खुर तिडक कर फट जाया करते हैं ।

इस के लिये नीचे लिखे उपाय काम में लाना चाहिये ।

(१) सीताफल के पत्ते और चूना दोनों को बारीक पीस फटे हुये खुर में मरना ।

(२) भिलावे का तेल लगाना

(३) फटे खुर को गर्म लोहे से दागना ।

### मस्सा होना

मुँह-खुरी में अक्सर जानवरों के तन्दुरुस्त होने के बाद खुरों के बीच मस्सा हो जाया करता है । अतः नीचे लिखे उपाय काम में लाना चाहिये:—

(१) सज्जी, चूना, तम्बाखू, चीतावल की जड़ और नीलायोषा मिलाकर मस्से पर पट्टी बांधना ।

(२) मस्से पर चूने का घिना बुझा केकड़ रखना और उसपर गर्म पानी डालना ।

(३) मस्से को काट डालना और जला देना ।

### सूचनायें

जानवर को खाने के लिये हलकी, पतली और पोषक खुराक देना चाहिये । इस के अलावा वे सब बातें याद रखना चाहिये जो शीतला में बताई गई हैं ।

### गर्भपात

#### लक्षण

गर्भाशय तथा योनि-मार्ग पर सृजन का होना । निश्चित समय से पूर्व ही व्रश्चे का गिर जाना । गर्भपात के पश्चात् जैर का न गिरना । पेशाब का अति बलवद्दार होना ।

## इलाज

१. शिवलिङ्गी के बीज ८

घी २० तोला ।

बीजों को बारीक पीस, घी में मिला, गर्भ गिरने से पूर्व पिलाना । इसी मात्रा में प्रति १२ घंटे बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए । इस तरह ४-५ दिन देना चाहिए । दवाई देने के पश्चात् गर्भ नहीं गिरेगा ।

जिन पशुओं का साधारणतया सदैव गर्भ गिर जाता है उनको:—

२. शिवलिङ्गी के बीज ४

घी २० तोला

उपर्युक्त विधि से पिलाना चाहिए ।

हर मास में यह दवाई देना चाहिए ।

## धनुर्वात

## लक्षण

जानवर बहुत अधिक सुस्त मालूम होता है । कई जानवर लकड़ी की तरह अकड़ जाते हैं । जानवर को बुखार भी होता है । इसमें जानवर भड़कने के लक्षण भी प्रकट करते हैं । श्वास तेज चलने लगता है । साधारणतः दस्त भी बंद हो जाया करते हैं । बच्चों के यह रोग होने पर वे दुग्ध पीना बन्द कर देते हैं ।

## इलाज

१. अलसिया १० तोला

ठण्डा पानी २० तोला

दारीक पीस पानी में मिलाना और जानवर को पिलाना ।

२. ओशीझाड़ा की जड़ १ तोला आटे में मिलाकर खिलाना ।

३. किलहारी का कन्द १ तोला आटे में मिलाकर खिलाना ।  
इस तरह दिन में २ बार खिलाना ।

४. असकन्द की जड़ २० तोला दाना में मिलाकर १० दिन तक देना ।

५. रोग ग्रस्त स्थान पर दाग लगाना ।

खान पान एवं हिदायतें :—अन्य रोगों की तरह ।

६. गौलत के बीज ५ नग

सोंठ २ तो.

काली मिर्च १ तो.

लौंग ॥ तो.

नमक १ तो.

पानी ४० तो.

उपरोक्त सभी चीजें बारीक करके पानी में उकालना और पानी जब ३० तोला बाकी रहे तब कुनकुना कर के पिलाना ।

७. रोगी जानवर को फसली के ऊपर दोनों ओर ३" लंबे ३।३ दाग लगाने से भी रोग जाता है ।

## जहरवात या जहरी बुखार

### लक्षण

यह रोग मोटे ताजे जानवरों को विशेष होता है ।

सर्व प्रथम कण्ठ पर गले के पास एक गांठ उत्पन्न होती है । गांठ का आकार करीब ५-६ इंच गोलाई का होता है । गांठ गर्म मालूम होती है । जानवर का खाना-पीना, बुगाली करना बन्द हो जाता है ।

बुखार मामूली होता है। गले पर सूजन होने से श्वास लेने में भी कठिनाई मालूम होती है। कभी कभी इसका आक्रमण स्तनों पर भी होता है।

### इलाज

१. सत्यानासी (स्वर्गाक्षीरी) १० तोला जड़

गुड़ २० तोला

दारीक पीस गुड़ में मिला जानवर को खिलाना चाहिए।

२. हुल्लुल पूरा पौधा १० तोला

आटे में मिलाकर खिलाना।

३. जिस व्यक्ति की सब से छोटी अँगुली और अँगूठों के पास वाली अँगुली लम्बी करने से मिलती हो तो उन से बछड़ी का गोबर लेकर सूजन पर गोल चक्कर बना देना और मध्य में से इस प्रकार 'X' चीर देना।

४. अन्त में सूजन पर गोल दाग लगाना चाहिए। दाग इस प्रकार X लगाना चाहिए।

### खुजली

अक्सर देखने में आता है, पशु के गले के बाल उड़े हुए छीदे छीदे से दीखने लगते हैं और पशु किसी वृक्ष अथवा दीवाल से रगड़ता है। ये खुजली के चिन्ह हैं। जो समय पाकर पूरे बदन पर फैल जाती है।

### इलाज

(१) मैसल २ तोला

गन्धक ४ ,,

भिलावा १०

गौघृत ३० तोला



सबको अलग अलग पीसना । शोमिल पीसने पर आग लग जाती है । मिलावों को भी अधिकचरे कर लेना चाहिए । तत्पश्चात् इनको पकाना चाहिए । इसके लिए ग्राम से बाहर का कोई सुरक्षित स्थान चुनना चाहिए । पकाने के लिए गोबर के कण्डे उपयोग में लाना चाहिए ।

सर्व प्रथम मिट्टी का कौरा वर्तन लेकर उसमें घी डाल देना । घी को कण्डों पर गर्म करना । कुछ देर बाद सावधानी से घी में ये सब डाल देना । मेंसल के बाद गन्धक डालना । अन्त में मिलावे डाल देना और पकाना चाहिए । पकाते समय धुंआ शरीर को नहीं लगने पावे । इसके लिए दवाई को हलाने के लिए लम्बा ढण्डा उपयोग में लाना चाहिए । या बहुत अधिक लम्बी सण्डसी से काम लेना चाहिए । पकाते समय जब वर्तन से हरे रंग का धुंआ निकलने लगे तब दवाई को पास में रखे हुये पानी में डाल देना चाहिए और ठण्डा होने पर जमे हुए घी को निकाल लेना चाहिए । तत्पश्चात् रोगी के लिए उपयोग में लाना चाहिए । जिस जानवर के खुजली हो उसके शरीर पर दिन में दो बार मालिश करना चाहिए । जो जानवर दवा को चाट जाते हों उनका मुँह बांध देना चाहिए । यह कुत्ता, आदमी को भी चलती है ।

(२) गन्धक  $\frac{1}{2}$  तोला

गौदुग्ध ४० ,,

घी ५ ,,

प्रथम गन्धक को घी में पकाना और गन्धक के पकने पर उसमें दूध मिला कर पिला देना ।

जित्त जानवर के खुजली हो जाय उसको अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए ।

## दाद (खोड़ा)

यह रोग छोटे बच्चों को अधिक होता है। जो बच्चे तंग जगह में बंधे रहते हैं उनको यह रोग विशेष होता है।

### लक्षण

जानवर के शरीर पर गोल गोल चकत्ते से पड़ जाते हैं। चकत्तों का रंग काला होता है। यह रोग अक्सर गर्दन या कानों पर होता है।

### इलाज

(१) करञ्ज का तेल ८ तोला  
गन्धक २ ३ ”

दोनों को मिलाना और गर्म करके लगाना।

(२) करञ्ज का तेल ८ तोला  
गन्धक ३ ”  
नीलायिथा ६ माशा

सबको शामिल मिला लेना और गर्म करके लगाना।

जिस जानवर के दाद हो जाय उसको दूसरे जानवरों से अलग रखना चाहिए।

(३) मीठे तेल में कोई भी चीजें तलकर के बचा हुआ तेल उसके शरीर को लगाना।

(४) रविवार को सुबह चायें कान को मुँह के सहारे काला घागा डाल कर बांध देना।

(५) रविवार को मेहरार को झाड़ू रोगी जानवर को लगाना।

## पेट-फूलना (आफरा)

### कारण

सड़ा, गला, चारा-दाना खा लेने से अक्सर जानवरों का पेट फूल जाता है तथा वर्षा ऋतु के आरम्भ में लालचवश हरा घास अधिक खा जाने से भी पेट फूल जाता है। समय पर पानी नहीं मिलने एवं खाने के बाद ही एकदम अधिक श्रम लेने से भी कभी कभी पेट फूल जाता है।

### लक्षण

जानवर बेचैन मालूम होता है। जानवर की नाईं कोख फूल जाती है। फूली हुई कोख को दबाने से पोली पोली दोल की भांति आवाज़ आती है। पेट में गैस भर जाती है। जानवर बार बार बैठता उठता है। कभी कभी अपनी नाईं कोख की ओर भी देखता है।

### इलाज

- (१) कड़वी काचरी १  
काला नमक ५ तोला  
अलसी का तेल ४० ,,

सबको मिलाना और गर्म करके जानवर को पिलाना चाहिए।

- (२) अरण्डी का तेल २० तोला  
काला नमक ५ ,,

दोनों को गर्म कर जानवर को पिलाना चाहिए।

- (३) कड़वी-काचरी १  
काला नमक २॥ तोला  
बकरी का पेशाब ८०

कड़वी काचगी को बारीक पीस लेना और पेशाब में मिलाकर गर्म करना । गर्म होने के बाद कुनकुना रहने पर जानवर को पिलाना ।

(४) गुड़ ८० तोला

पानी २४० ,,

दोनों को गर्म कर पिलाना ।

(५) मेंढापाती ३० तोला

पानी ६० ,,

मिलाकर गर्म करके जानवर को पिलाना ।

(६) दागनाः— दाग इस प्रकार लगाना—

जानवर के दोनों कोखों के नीचे इस प्रकार U दाग लगा देना । जानवर को आराम देना चाहिए । खाने को हल्की-पतली और पोषक खुराक देना चाहिए ।

## पेट का दर्द

### कारण

चारा-दाना अधिक खा लेने से जानवर के पेट में जम जाता है जिससे वह बेचैन रहने लगता है । और पेट में एकदम दर्द होता है । कभी कभी यह दर्द रुक रुक कर चलता है । इसको शूल कहते हैं । जब जानवर सूखा चारा-दाना खाता है और उसको समय पर पानी नहीं मिलता तो उस समय भी जानवर के पेट में दर्द होने लगता है ।

### लक्षण

खाना-पीना, जुगाली करना बन्द हो जाता है । जानवर बार बार उठता बैठता है । कभी कभी पतला थोड़ा-थोड़ा गोबर भी करता है । जानवर अपनी बाईं कोख की ओर बार बार देखता भी है ।

## इलाज

१. बबूल के काँटे जोड़ी १०८ (कुटे हुए)

पत्थर

२१ (साधारण काले रंग के बुले हुए पत्थर)

सियाल वैटनिया का चूर्ण ५ तोला

सोंठ

२३ तोला

पानी

१२० तोला

काढ़ा बनाना । ६० तोला पानी शेष रहने पर नीचे उतार लेना  
और कुनकुना जानवर को पिलाना ।

२. अदरक

३ तोला

शिलाजीत

२० तोला

सियाल वैटनिया चूर्ण

३ तोला

लौंग

१ तोला

काली मिर्च

१ तोला

सैधा नमक

३ तोला

पानी

८० तोला

काढ़ा बनाना । ६० तोला पानी शेष रहने पर नीचे उतार लेना  
और कुनकुना जानवर को पिला देना । काढ़ा छानकर पिलाया जाय ।  
इसके अलावा जानवर को आराम देना चाहिए ।

- खाने में बहुत हल्की वस्तु देना चाहिए ।

## मुँह में के काँटे बढना

## कारण

जानवर कभी कभी बहुत गर्म एवं अत्यन्त कड़ी वस्तु खा जाता  
है । कभी कभी भीतरी गर्मी भी बढ़ जाया करती है और इस तरह मुँह

में काँटे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग इन काँटों को “आलों” के नाम से भी सम्बोधित करते हैं। मुख्यतः जिस जानवर को सदैव कब्ज रहती है उसके मुँह में अक्सर ये “आले” बढ़ जाती हैं।

### लक्षण

जानवर खान-पान एवं जुगाली करने में कर्मी प्रकट करता है। मुँह में से लार गिरती रहती है। मुँह में कं काँटे बढ़ जाते हैं। मुँह में हाथ डालने पर मुँह बहुत गर्म मालूम पड़ता है।

### इलाज

१. जानवर को जुलाब देकर उसका पेट साफ करना।
२. प्रतिदिन सुबह शाम काँटों पर नमक घिसना।
३. नारियल की रस्ती में नमक लपेट उस से काँटों को घिसना।
४. तेज कैंची से काँटों को काट डालना और ऊपर हल्दी एवं मक्खन मिलाकर लगा देना चाहिए।

### खान-पान

जानवर को मुलायम घास एवं हल्की पतली पोपक खुराक खाने को देना चाहिए।

### दस्त लगना

#### कारण

अजीर्ण एवं अपचन होने से जानवरों को दस्त लगने लगते हैं।

#### लक्षण

जानवर बार बार पतला गोबर करता है। जुगाली करना बन्द कर देता है। जिस जानवर को दस्त लगते हैं वह बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। जानवर बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है।

## इलाज

१. प्रथम बहुत हल्का जुलाब देकर जानवर का पेट साफ करना चाहिए ।

२. दही १६० तोला

भंग १ तोला

पानी ४० तोला

तीनों को मथकर पिला देना ।

३. छाछ बघारा २० तोला

जली ज्वार २० तोला

छाछ १२० तोला

तीनों को मथकर पिलाना ।

४. शीशम की पत्ती २० तोला

पानी १०० तोला

पत्तों को बारीक बांट लेना और पानी में मिलाकर जानवर को पिलाना ।

## खान-पान

जानवर को खाने के लिए मुलायम घास देना चाहिए । जहाँ तक बन सके गर्म वस्तु से जानवर को बचना चाहिए ।

## शीत-पित्त या पित्ती उछलना

## कारण

यह रोग पित्त की खराबी के कारण उत्पन्न होता है । कारण विशेष से पित्त रक्त में मिल जाता है । और शरीर पर जगह से सूजन आकर चकत्ते से पड़ जाते हैं ।

## लक्षण

चमड़ी पर जगह जगह मच्छर के काँटे जैसे गोल गोल चकते पड़ जाते हैं। ये चकते २-३ इन्च तक चौड़े होते हैं। जानवर के सारे शरीर पर अत्यन्त खुजली चलती है। शरीर पर चकते बार बार उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं।

## इलाज

- (१) प्रथम जानवर को जुलाब देना चाहिये।
- (२) सेंधानमक ३ तोला (वारिक)  
सरसों का तेल ३० तोला  
काली मिर्च १ तोला (वारिक बाँटकरके)  
गरम करके पिलाना।
- (३) खाकरा (पलासकी) जड़ ४० तोला लेकर पानी में उकालना  
और उस पानी से जानवर को स्नान कराना।
- (४) घुड़वच ५ तोला (पीसकर), सरसों का तेल २० तोला,  
गरम करके पिलाना।

## अपचन

### कारण

कभी २ जानवर लालचवश अधिक खा जाते हैं जिस से अपचन व्यावृद्धजमी हो जाती है। सड़ा-गला और गन्दा चारादाना खाने से भी अपचन हो जाता है। जानवर के जब कभी अधिक खाने में आ जाता है तथा पीने की पानी नहीं मिलता तब भी अपचन हो जाता है।



## लक्षण

जानवर सुस्त एवं चिन्तित मालूम पड़ता है ।

जानवर जो चारा-दाना खाता है वह पूरा हजम नहीं होता है और दिन प्रति दिन अधिकाधिक कमजोर होकर सूखता चला जाता है । जुगाली करने में अनियमितता होती है । पानी अधिक पीता है ।

## इलाज

(१) तेल मीठा ३० तोला । इसको ३० तोला गर्म पानी में मिलाकर जानवर को पिलाना चाहिये । पानी को गर्म करते समय उसमें थोड़ा नमक काला (३ तोला) डाल देना चाहिये ।

(२) गुड़ २० तोला

गौलन के बीज १०

आम्राहलदी ५ तोला

गठार बीज ५

फिटकरी २ तोला

पानी ६० तोला

काला नमक ५ तोला

गर्म कर कुनकुना पिलाना चाहिये ।

(३) बर्तिसा गर्म पानी के साथ देना चाहिये ।

## पेट में कीड़े पड़ना

### कारण

यह रोग छोटे बछड़ों को अक्सर ज्यादा होता है ।

सड़ा-गला एवं गन्दा चारा-दाना खाने से यह रोग होता है । कभी कभी जानवर कीड़े पड़ा हुआ पानी पी जाता है और इस तरह पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ।

## लक्षण

जानवर भली प्रकार खाता-पीता रहता है और दुबला होता जाता है। गोबर में छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं। जानवर को दस्त लगते हैं जो मट-मैले रंग के होते हैं।

## इलाज

(१) किलहारी की जड़	३ तोला
काला नमक	५ तोला
करींदा की जड़	१ तोला
गुड़	२० तोला
पलाश के बीज	३ तोला
पानी	१२० तोला

सबको बारीक पीस गर्म करना और कुनकुना जानवर को पिलाना चाहिये।

(२) नीम की पत्ती	५ तोला
काला नमक	५ तोला
गुड़	२० तोला
दतूनी की जड़	५ तोला
अमलतास का गूदा	२ तोला
पलाश के बीज	३ तोला
पानी	१२० तोला

सबको बारीक पीस गर्म करना और कुनकुना रहने पर जानवर को पिलाना चाहिये।

(३) बत्तीसा १० तोला गर्म पानी के साथ देना चाहिये।

## खान-पान

जानवर को हलकी पतली और पोषक खुराक देना चाहिये ।

जानवर से श्रम न लिया जाय । और उसे साफ कुँड़े का पानी पिलाया जाय ।

## पेचिश

### कारण

बदहजमी होने से अक्सर पेचिश हो जाती है ।

### लक्षण

जानवर बार बार गोबर करने की इच्छा करता है और थोड़ा थोड़ा रक्त-मिश्रित पतला मल बाहर निकलता है । जानवर को दस्त कट कट कर आते हैं ।

### इलाज

(१) मरोड़ फली	१० तोला
सहाजीरा	१० ”
छाछ	८० ”

उपर्युक्त दोनों वस्तुओं को बारीक पीस छाछ में मिला छानकर जानवर को पिलाना चाहिए ।

खान-पान और सूचनार्थः— जानवर को अधिक गर्म वस्तु नहीं खिलाना चाहिए । जानवर को आराम देना चाहिए । इसके अलावा हलकी, पतली और पोषक खुराक देना चाहिए । घास बहुत मुलायम ढालना चाहिए ।

## जुकाम

### कारण

यह कोई रोग नहीं है; लेकिन एक प्रकार का रोग का लक्षण है। गर्म जगह से ठण्डी जगह में और ठण्डी से एकदम गर्म जगह में जानवर को बदलने से अक्सर जुकाम हो जाता है। कड़ा श्रम करके आते ही ठण्डी पानी पिला देने से भी जुकाम हो जाता है।

### लक्षण

जानवर सुस्त रहता है। खाना, पीना, जुगाली करना कम करता है। बार बार छींकें आती हैं। नाक से पतला पतला पानी निकलता है। कभी कभी हलका ज्वर भी चढ़ आता है।

### इलाज

(१) नावा	२ तोला	(२) सप्तपरण पत्ते	१ तोला
नमक	१ ,,	तुलसी के पत्ते	१ ,,
पानी	४० ,,	नमक	१ ,,
उबाल कर दें।		पानी	४० ,,
		उबाल कर दें।	

इसके अलावा लहसुन, नमक, अदरक और पानी या काली मिर्च, लौंग, चाय, काला नमक और पानी को भी ऊपर लिखानुसार दे सकते हैं।

## खाँसी

### कारण

प्रायः बदहजमी एवं सर्दी-गर्मी के कारण अक्सर खाँसी चलती रहती है। यह भी कोई रोग नहीं है; एक प्रकार का किसी रोग विशेष का लक्षण है।

## लक्षण

जानवर सुस्त रहता है। खान-पान में कमी प्रकट करता है। जुगाली कम करता है। रोवें खड़े हो जाया करते हैं। कमी कमी खर भी हो जाता है। अक्सर कब्ज रहा करती है। नाक एवं आँख से पानी गिरता है। श्वास की गति बढ़ जाती है।

## इलाज

१. साल के छिलके ५ तोले और तिनौले आधा सेर बिना भिगोए ही जानवर को खिलावें।
२. कलई के चूने का पानी १० तोला  
फुलाया हुआ सुहागा ४ आनेभर  
मिलाकर जानवर को पिला दें।
३. कलई का चूना १ तोला  
फुलाई हुई फिटकरी १ तोला  
छाछ ३० तोला मिलाकर दें।

## निमोनिया

### कारण

जलवायु में एकदम परिवर्तन होने से अक्सर निमोनिया हो जात है। पर्सनि एवं बुखार की हालत में बहुत ठण्डा पानी पीने से हवा लगा जाने से या वर्षा में भीगने से भी यह रोग हो सकता है।

### लक्षण

जानवर बहुत सुस्त एवं चिन्तित दिखाई देता है।

जानवर का खाना पीना और जुगाली करना अक्सर बन्द हो जात है। रोवें खड़े हो जाते हैं। जुकाम और खांसी के सब लक्षण इसमें

दिखाई देते हैं। जानवर के शरीर पर कैपकैपी होती है। साधारण त्वर हर समय बना रहता है। आँखें लाल हो जाती हैं। नाक से बलगम निकलता है। जानवर की नाड़ी एक मिनट में ८० से १०० तक चलने लगती है। जानवर उसी बाजू पर दबाव देकर बैठता है कि जिस बाजू पर जानवर के फेफड़े में दर्द होता है। बार बार दाँत पीसता है। रोग शुरू होने के बाद ६-७ दिन तक बीमारी बढ़ती है। जब त्वर एकदम कम हो जाय और श्वास जानवर सहूलियत से लेने लगे तो समझना चाहिए कि तबियत कुछ विशेष खराब है। इस प्रकार जानवर काफी कष्ट पाता है। दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। तत्पश्चात् कुछ दिन में जानवर मर जाता है।

### इलाज

१. जानवर को बन्द कमरे में रखना। जानवर के शरीर पर घास रखकर उसको अच्छा बढिया साफ कम्बल ओढ़ाना।

२. घुड़-बछ	५ तोला
गोलन फल	२ तोला
काली जर्गी	५ तोला
सैंधा नमक	५ तोला
लहसुन	५ तोला
गुड़	१० तोला
पानी	१२० तोला

सब वस्तुओं को बारीक पीसना और पानी में मिलाकर काढ़ा बनाना। ५० तोला पानी शेष रहने पर उतार देना और बिना छाने ही कुनकुना जानवर को पिला देना चाहिए।

३. अजवायन	२ ½ तोला
सोंठ	२ तोला
मेथी	४ तोला
लहसुन	३ तोला
अलासिया	४ तोला
गुड़	४० तोला
पानी	८० तोला

ऊपर लिखानुसार काढ़ा बनाना और ५० तोला पानी शेष रहने पर उतारकर बिना छाने ही पिला देना ।

४. मुहागा	३ तोला
लौंग	१ तोला
काली मिर्च	१ तोला
शराब	१० तोला

सब को बारीक पीस शराब में मिलाकर पिला देना चाहिए ।

५. अमृत धारा और सरसों का तेल मिलाकर पसलियों पर मालिश करना चाहिए ।

### खान-पान

दवाई पिलाने के ३-४ घण्टे बाद तक जानवर को पानी नहीं पिलाना चाहिए । जब भी पानी पिलाया जाय गर्म पिलाया जाय । खाने के लिए चावल का माण्ड या अलसी की कुलकुनी चाय देना चाहिए । मुलायम घास एवं हलकी पतली पोषक खुराक बराबर देते रहना चाहिए ।

### सूचनाएं

जानवर के शरीर पर हवा का झोंका न लगने पाए जानवर को जहां तक बन सके अधिक ढीली और पतली दवा नहीं पिलाना चाहिए । नाक द्वारा दवाई जहाँ तक बने नहीं पिलाना । रोगी को निरोगियों से अलग रखना ।

## दमा

अक्सर अधिक दिन तक अपचन रहने से दमा रोग हो जाता है ।

जानवर को अधिक दौड़ाने से एवं अधिक या अनियमित भ्रम लेने से भी श्वास की गति में अन्तर आ जाता है ।

## लक्षण

जानवर का सुस्त रहना एवं काला पड़ जाना ।

जल्दी जल्दी और खींच खींच कर श्वास लेना ।

नाक से बलगम गिरना । निरन्तर खांसी चलना ।

## इलाज

दमा दो प्रकार का होता है :—

(१) सर्दी का दमा और (२) गर्मी का दमा ।

## गर्मी के दमा के लिये

(१) दही ८० तोला

शक्कर ४० तोला

दोनों को मयकर जानवर को पिलाना चाहिये ।

(२) दूध ८० तोला

मुर्गी का अंडा १

मिलाकर जानवर को खिलाना । इस तरह २ दिन तक शामा सुदृह पिलाना ।

## सर्दी के दमा के लिये

(१) सरसों का तेल ३० तोला

काला नमक १० तोला

होंग ३ तोला

सबको गर्म कर जानवर को पिलाना ।



(२) गुड़	२० तोला
हलदी	३ तोला
काला नमक	३ तोला
गौलन के बीज	३ तोला
पानी	

सबको मिला गर्म कर जानवर को पिलाना चाहिये ।

### खान-पान

मुलायम घास देना चाहिये ।

हलकी पतली पोषक खुराक देना चाहिये

पानी ताजा और कुँए का पिलाया जाय ।

### सूचनायें

जानवर को कुछ समय आराम देना ।

जानवर को अगर बल सके तो खुले स्थान में न रख बन्द मकान में रक्खा जाय ।

नोट:—यह दवा एक सप्ताह तक देना जरूरी है ।

### पेशाब में खून आना

#### कारण

अचानक किसी जगह घातक चोट लगना ।

जहरीली वस्तु का पेट में चला जाना ।

#### इलाज

(१) गेंदू का मैदा ४० तोला

पानी ८० तोला

दोनों को मथकर जानवर को पिलाना चाहिये ।

(२) बबूल की पत्ती	२० तोला
हलदी	३ तोला
चन्दन का तेल	४ तोला
पानी	४० तोला

बारीक पीस छानकर पानी में मिला देना और सुबह शाम जानवर को पिलाना चाहिये ।

### खान-पान

कब्ज करनेवाली वस्तु जानवर को न खिलाना । जानवर को शीशम की पत्ती खिलाना ।

### पेशाब का रुक जाना

#### कारण

गुदों की कमजोरी के कारण एवं पयरी की वजह से पेशाब बन्द होता है । सूखा चारा अधिक खाने और बाद में कम पानी मिलने पर भी यह दर्द हो सकता है ।

#### लक्षण

जानवर का अत्यधिक बेचैन होना ।

पेशाब का रुक जाना ।

जानवर का बार बार उठना-बैठना ।

पेशाब करने का बार बार प्रयत्न करना और पेशाब नहीं आना ।

#### इलाज

(१) मेंढापाती	२० तोला
कलमी शोरा	१ तोला
शीतल चीनी	५ तोला
पानी	८० तोला

बारीक पीस सबको मिलाना और जानवर को पिला देना चाहिये ।

- (२) कांस के फूल                      ३ तोला  
 देशफल (पलाश के फूल) १० तोला  
 पानी                                      ४० तोला  
 बारीक पीस जानवर को पिलाना चाहिये ।

### दाग लगाना

दाग नीचे लिखानुसार लगावें ।

(१) प्रथम पीठ पर मकड़ी से चार अँगुल आगे गर्दन की ओर दाग लगावें । दाग लोहे को गर्म करके लगाना चाहिये ।

(२) दूसरे दाग आगे के दोनों पैरों के बीच जो उभरा हुआ भाग रहता है, उसपर लगावें । इस जगह दाग सच्चल के लगाना चाहिये ।

- (३) इन्द्रजव                              ४० तोला  
 पानी                                      ८० तोला

इन्द्रजव बारीक पीस करके ठण्डे पानी के साथ देना ।

### सांड के फोतों का सूज जाना (पोतों का)

#### कारण

अचानक घातक चोट लगना । एक विशेष प्रकार के कीटाणुओं के आक्रमण से भी सूजन आ जाती है । वादी आने से भी सूजन आती है ।

#### लक्षण

जानवर का देचैन रहना । पशु अपने पीछे वाले पैर फैलाकर खड़ा रहता है । साधारण ज्वर भी कभी कभी आता है ।

#### इलाज

(१) नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर कुनकुने पानी से फोतों पर सेक करना चाहिए ।

(२) डीकामाली और खोपरे का तेल मिलाकर सूजन पर लगाना ।

## मिरगी

यह रोग अक्सर छोटे बच्चों में अधिक होते देखा गया है। पेट में हरवक्त गड़बड़ रहने से यह रोग अधिक होता है। कभी कभी पेट में कीड़े पड़ने से भी यह रोग होता है।

### लक्षण

अचानक जानवर कांपने लगता है।

गर्दन, पैर एवं सारा शरीर एकदम अकड़ जाता है।

रोग का आक्रमण होते ही जानवर अचानक गिर पड़ता है।

### इलाज

(१) सर्व प्रथम जानवर को तेज़ जुलाव देकर उसका पेट साफ करना चाहिए और तत्पश्चात् दूसरा इलाज करना चाहिए।

(२) जानवर के गिरते ही एकदम उसको औंधा जूता घुसाना।

(३) चिरौंजी का तेल १० तोला

तारपीन का तेल ३ „

दोनों को मिलाकर जानवर को देना चाहिए।

(४) ढांढण के बीज १० तोला

मेथी के बीज १० „

पैवार के बीज १० „

सेंघा नमक ३ „

सबको बारीक पीस लेना और मिलाकर पानी में काढ़ा बनाकर जानवर को देना चाहिए।

(५) नीम की सूखी पत्ती ३ तोला

काली मिर्च १ „

पानी २० „

वारीक पीसकर पानी में घोल सबको एक कर लेना और पश्चात् जानवर को पिलाना ।

### खान-पान

दवाई देने से पूर्व ४-५ घण्टे तक जानवर को भूखा रखना चाहिए । तत्पश्चात् जानवर को हलकी और पोषक खुराक देना चाहिए । कब्ज करने वाला चारा-दाना जानवर को न दिया जाय । जहाँतक बन सके जानवर को कम खिलाया जाय और पेट साफ रखा जाय ।

सूचनाएँ:— कब्ज न होने देना । बांधने का स्थान विलकुल साफ रखना चाहिए । जानवर को आग-पानी से बचाना चाहिए । चूँकि अन्दर गिरकर अपने सारे शरीर को जला सकता है । अगर पानी में गिर पड़ा तो डूबकर मर जायगा ।

### बुखार

#### कारण

साधारणतया मौसम में एकदम परिवर्तन होने के कारण और उसका जानवर पर बुरा असर पड़ने से अक्सर जानवरों को बुखार चढ़ जाता है । खाने-पीने में गड़बड़ होने से एवं हर वक्त कब्ज रहने से भी जानवर बुखार के शिकार बन जाते हैं । इसके अलावा कई रोगों में भी जानवरों को ज्वर आया करता है ।

#### लक्षण

जानवर सुस्त रहता है । शरीर अत्यधिक गर्म प्रतीत होता है । श्वास की गति बढ़ जाती है । खाना-पीना और यहाँ तक कि जुगाली करना बन्द हो जाता है । शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं । नाड़ी बहुत तेज चलती है । जानवर के पेशाब का रंग लाल होता है ।

## इलाज

१. जानवर को बन्द कमरे में रखना और एक जुलाब देना । इसके बाद नीचे लिखी दवा देना चाहिए ।

२. नाया	२ तोला
नमक	५ तोला
कुटक	२ तोला
चिरायता	२ तोला
पानी	१२० तोला

काढ़ा बनाना और आधा रहने पर नीचे उतारकर छानकर कुनकुना जानवर को पिला देना चाहिए ।

३. लाल कनेर की जड़	१ तोला
गटार के बीज	२ तोला
हलदी	२ तोला
कुटक	३ तोला
चिरायता	३ तोला
पानी	१०० तोला

४. कड़वी काचरी की जड़	१ तोला
आम्र हलदी	२ तोला
गुड़	२० तोला
पानी	१०० तोला

काढ़ा बनाना और आधा रहने पर छानकर कुनकुना पिला देना ।

## खान-पान

हरी और मुलायम घास देना चाहिए ।

चाँवल का माण्ड एवं अलसी की चाय अवश्य पिलाई जाय ।

कुएँ का ताजा पानी ही पिलाया जाय ।

## सूचनाएं

जानवर को झूल ओढ़ाकर रखना चाहिए और हवा के झोंकों से बचाना चाहिए। अगर अधिक तेज ज्वर हो तो उसमें जुलाब न दिया जाय। ठण्डा पानी भूलकर भी नहीं पिलाना चाहिए वरना नीमोनिया हो जाने का भय रहता है।

## बिल्ल

### कारण

इस रोग में जानवर का शरीर जकड़ जाता है। इस रोग के पैदा होने का कारण एक प्रकार का सफेद-झागदार कीड़ा है जो अक्सर वर्षा ऋतु में हरे घास पर पाया जाता है। घास के साथ जानवर इस सफेद-झागदार कीड़े को खा जाता है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कीड़ा नाक में जाकर अटक जाता है।

### लक्षण

जानवर सुस्त एवं चिन्तित मालूम होता है। खाना-पीना, जुगाली करना बन्द हो जाता है। जानवर का शरीर अकड़कर लकड़ी के सदृश बन जाता है। मुँह से झागदार फेनयुक्त पानी निकलता है।

### इलाज

१. बाघ नखे के पत्तों का २ तोला रस ५ तोला पानी में नाक से पिलावें।
२. प्याज का रस १ तोला लहसुन की कली २ नग पानी ५ तोला नाक से पिलावें।
३. कड़वी तुम्बी की बेल सिर पर बांधना चाहिए।
४. तम्बाकू का रस और पानी नाक से पिलाना चाहिए।

## गठिया या जोड़ों का दर्द

### कारण

जानवर के शरीर में रक्त में किसी प्रकार की खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। खराब चारा-दाना और गन्दा पानी पीने से भी यह रोग उत्पन्न होता है।

### लक्षण

जानवर अत्यन्त सुस्त मालूम होता है। खाना-पीना और जुगाली करना क्रमशः बन्द करता जाता है। जोड़ों और पुष्टों पर सूजन आ जाती है। जोड़ों पर सूजन आती है और उतर जाती है। इस तरह सूजन आती है और उतरती है और यह क्रम कई दिन तक चलता रहता है। सूजन एक जोड़ से दूसरे जोड़ पर चली जाती है और कुछ दिन बाद पुनः उसी जोड़ पर वापस चली आती है। कभी-कभी चर भी चढ़ता रहता है।

### इलाज

१. सामर बेला	४० तोला
गिरधान	४० तोला
नागोरी असकन्ध	४० तोला
काला कुड़ा	४० तोला

इन सब की बारीक पिसकर इनका चूर्ण बना लेना चाहिए और इस चूर्ण में से १० तोला लेकर ३० तोला गर्म पानी के साथ रोगी को देना चाहिए।

२. मेथी	२० तोला
पुवाड़िया के बीज	२० तोला
काला नमक	२ तोला
पानी	२४० तोला



सब को बारीक बाँट लेना चाहिए और पानी मिलाकर पकाना चाहिए। जब अच्छा पक जाय, जानवर को खिला देना चाहिए।

३. सामर ब्रेला	१० तोला
गोदुग्घ	८० तोला

दोनों को मिलाकर जानवर को देना चाहिए। इस तरह १ मास तक देना चाहिए।

४. दागना

जोड़ों पर जहाँ सूजन आ जाय, खड़े दाग लगाना चाहिए।

### खान-पान

खाने के लिए जानवर को हरी मुलायम घास देना चाहिए। पाने के लिए कुनकुना या ताजा कुएँ से निकाला पानी ही जानवर को पिलाना चाहिए। जानवर को द्विदल धान्य की चरी एवं दाना नहीं देना चाहिए।

## बच्चा गिरा देना

### कारण

अक्सर अत्यधिक कमजोर मादा जानवरों में कारण विशेष से निश्चित समय से पूर्व बच्चा गिर जाता है। जानवर को दौड़ाने, डराने कूदाने से भी बच्चा गिर जाता है। जानवरों के आपस में लड़ने और लड़ने पर घातक चोट लगने से भी जानवर हमल गिरा देते हैं।

कभी कभी बिना किसी कारण के भी जानवर बच्चा गिरा देता है और एक जानवर के गिराने पर अन्य जानवर भी अचानक बच्चे गिराने लगते हैं ऐसी हालत में इस रोग को 'छुतदार गर्भपात' समझना चाहिए। छुतदार गर्भपात होने पर छुतदार गर्भपात का इलाज करना चाहिए और कारण विशेष से गर्भपात होने पर साधारण गर्भपात का इलाज करना चाहिए।

## लक्षण

जानवर निश्चित समय से पूर्व ही गर्भ गिरा देता है।

## इलाज

(१) सर्व प्रथम जब जानवर गर्भ गिराने के निशान प्रकट करे तो तुरन्त ऐसे जानवर को अन्य जानवरों से अलग कर लेना चाहिये।

(२) शिवलिंगी के बीज ८

दुग्ध ४० तोला

बीजों को बारीक पीसलें और दूध में मिलाकर दें।

(३) कढ़ई का गोंद २० तोला

पानी १ सेर

गोंद को गला कर दें।

(४) मिश्री १० तोला

घी २० तोला मिलाकर दें।

## जेर न गिरना

### कारण

निरोग जानवरों में जनने के बाद अक्सर १०-११ घण्टे के बाद जेर बाहर निकल आती है। कमजोर एवं रोगी जानवरों में जेर अक्सर देर से गिरती है। कभी कभी ४८ घण्टे तक जेर अन्दर रह जाती है। जेर को जहाँ तक बन सके जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए।

### लक्षण

जेर नहीं गिरने तक जानवर सुस्त रहता है।

चारा-दाना ठीक ढंग से नहीं खाता है।

योनि मार्ग से नापसन्द दुर्गन्ध आती है।

कभी कभी जेर के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बाहर आते हैं।

## इलाज

(१) फेफर की पत्ती या छाल ८० तोला

गुड़ २० तोला

पानी २४० तोला

काढ़ा बनाना । आधा पानी रहने पर उतार लेना और छान कर कुनकुना जानवर को पिला देना ।

(२) तिल्ली का तेल ४० तोला कुनकुना गर्म कर पिलाना चाहिये ।

(३) असगंध ५ तोला

अजवायन १० तोला

त्रांस की पत्ती १० तोला

सेंट २ तोला

गोदुग्ध १६० तोला

गुड़ २० तोला

कुनकुना गर्म करना और जानवर को पिला देना ।

(४) अदरक ५ तोला

गौलन के बीज १ तोला

अजवायन १० तोला

गुड़ २० तोला

गोदुग्ध १६० तोला

ऊपर लिखानुसार पिला देना ।

(५) जानवर को गूलर के फल खिलाना चाहिये ।

(६) दवाइयाँ देने पर भी अगर जेर न गिरे तो हाथ से निकालना चाहिए । इससे जानवर को बहुत तकलीफ होती है । जहाँ तक हो यह प्रयोग न करें । हाथ के नाखून काट लेना चाहिए और हाथ को कोहनी

तक तेल या वेंसलीन से त्रिकना कर लेना चाहिए । तत्पश्चात् जहाँ जहाँ चिपक रही हो अँगूठे के पास वाली अँगुली से छुड़ाते जाना चाहिए और जेर को निकाल लेना चाहिए ।

### खान-पान

गाय को हल्की पतली और कुनकुनी वस्तु देनी चाहिए ।

वास बहुत मुलायम देना चाहिए ।

सफाई की ओर विशेष ध्यान रक्खा जाय ।

## स्तनों का सूज जाना

### कारण

यह रोग अक्सर अधिक दुग्ध देने वाले जानवरों को होता है ।

जानवर जब जनता है तो वह अत्यधिक कमजोर हो जाता है । जानवर कमजोर हो जाता है और “हेवान” में दुग्धोत्पादन क्रिया जोरों से होने लगती है । ऐसी हालत में कमजोर जानवर के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है ।

इस रोग में हेवाना और स्तन दोनों सूजते हैं ।

इस के अलावा गन्दी जगह में बैठने, खराब हवा लगने, असमय दुग्ध निकालने और हेवाना और स्तनों पर चोट लगने से भी यह रोग उत्पन्न होता है । एक प्रकार के विपैले कीटाणुओं के कारण भी यह रोग उत्पन्न होता है और ऐसी हालत में यह रोग द्रुतदार समझा जाता है ।

### लक्षण

हेवाना सूज कर उनका रंग लाल-सा हो जाता है ।

प्रथम स्तनों से दूध कम निकलता है और तत्पश्चात् सड़ा और गन्दा नापसन्द दुर्गन्ध वाला दुग्ध निकलता है । कुल समय बढ़ पीप और रक्त आने लगता है ।

जानवर अपने पीछे वाले पैर फैलाकर खड़ा रहता है ।

जानवर बैठना चाहता है; परन्तु बैठा नहीं जाता है ।

### इलाज

जहाँ तक बन सके इस रोग को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए । इसके लिए जानवर के हेवाना एवं स्तनों की भली प्रकार देखभाल करना चाहिये । दुग्ध-दोहन के समय दुग्ध पूरा पूरा निकालना चाहिए । दुग्ध-दोहन के बाद सप्ताह में २ बार स्तनों पर घी अवश्य लगाते रहना चाहिये ।

(१) प्रथम नीम के पत्ते और पानी को उबालना चाहिये और इस पानी को कुनकुना रखकर हेवाना एवं स्तनों पर सेक करना चाहिये ।

(२) आम्रवा हलदी

फिटकरी

सैधा नमक

गौघी (गाय का घी)

बारीक पीस कर घी में मिलाना चाहिये और गर्म कर के कुन-कुना रहने पर हेवाना एवं स्तनों पर लेप करना चाहिये ।

### खान-पान

गाय को ऐसी खुगक देना चाहिये जो हल्की हो और जिससे दुग्धोत्पादन कम मात्रा में हो । कूज करने वाली कोई वस्तु नहीं दी जाय । ताजा पानी पिलाना चाहिये और जानवर को पूर्ण आराम देना चाहिये ।

## बच्चेदानी का बाहर निकल आना

### कारण

प्रजनन अवस्था के अत्यधिक पास आ जाने पर वृद्ध गायों में एवं कमजोर गायों में बच्चेदानी बाहर निकल आती है ।

## लक्षण

प्रजनन अवस्था के पूर्व या बाद में जब कि जानवर जेर या बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाता है; बच्चादानी अक्सर बाहर आ जाया करती है।

## इलाज

बच्चेदानी के बाहर निकलते ही शराब या सुरजमुखी पाँचे के उबले पानी को ऊपर छिड़क कर सिकोड़ना चाहिए और बहुत सावधानी से सफाई का खयाल रखते हुए अन्दर डाल देना चाहिए। बच्चेदानी को अन्दर डालने से पहिले नीम के पानी से धो लेना चाहिए। बच्चेदानी को अन्दर डालकर रेसिस्यों का सशरा दे देना चाहिए ताकि पुनः बाहर न निकल जाय।

(१) काली मिर्च ५ तोला

गाय का घी २० ,,

मिर्च को बारीक पीस लेना चाहिए और घी में मिलाकर पिला देना चाहिए। ८ दिन तक हर रोज देना।

(२) सामर चैला ५ तोला

नीम-गिलोय ५ ,,

पानी के साथ देना चाहिए।

(३) दही ४० तोला

धृत कुमारी का गूदा (गंवार पाटा) २० तोला

गूदा पीसकर दही में मिलाकर खिलाना।

(४) मसूर की दाल ५ तोला

दही ८० ,,

दालको जलाकर बारीक करके दहीके साथ कुछ पानी डालकर देना।

## खान-पान

जानवर को मुलायम हरी घास एवं हलकी, पतली और पोषक खुगक दी जानी चाहिए। इसके अलावा जानवर को बांधकर रखना चाहिए और पूर्ण आराम देना चाहिए। सफाई की ओर विशेष खयाल रखना चाहिए।

## गाय का गर्भधारण न करना

### कारण

साधारणतः अधिक कमजोर जानवर निश्चित समय पर गर्भधारण नहीं किया करते हैं। कुछ जानवर अपने शरीर पर चर्बी बढ़ा लेते हैं और गर्भधारण नहीं करते हैं।

### लक्षण

गाय का संयोग-इच्छा प्रकट नहीं करना और इस ओर से पूर्ण उदासीन रहना।

### इलाज

जानवर को "E" प्रकार का खाद्योज अधिक मात्रा में देना चाहिए और अगर कमजोर हो तो तय्यार करना चाहिए।

(१) छुहारे-खारक ४ सेक कर जानवर को देना चाहिए। ८ दिन तक देना।

(२) पलाश के पत्तों के पास की गांठ या २ बीटणी लेकर आटे में मिला लेना चाहिए और ४ दिन तक जानवर को खिलाना चाहिए।

(३) निसंग या ४ गुज्र लेकर आटे में जानवर को खिलाना चाहिए। २ रोज देना।

(४) सरसों का तेल २० तोला ८ दिन तक पिलाना चाहिए।

(५) बचल के कोंठों में रहने वाला कीड़ा ४ दिन तक आटे में मिलाकर जानवर को खिलाना चाहिए ।

(६) जानवर को मिलावे देना चाहिए । ४ मिलावे आटे के साथ ४ दिन तक देना ।

(७) जानवर को ४० तोला तेल प्रतिदिन खिलाया जाय । ४ दिन तक ।

### खान-पान

जो जानवर अधिक कमजोर हों उनको मोटा बनाया जाय । जिन पर अत्यधिक चर्बी बढ़ गई हो उनको उनसे श्रम लेकर कमजोर बनाया जाय । खुराक हल्की दी जाय ।

## गाय का बार बार गाभिन होना

### कारण

अगर जानवर को अधिक मात्रा में गर्म वस्तुएं खिलाई जायें तो उनमें यह खराबी पैदा हो सकती है । साँड़ में कुछ अवगुण होने पर भी ऐसा हो सकता है ।

### लक्षण

जानवर का बार बार गर्भ होना और गर्भ धारण नहीं करना ।

### इलाज

जानवर के गर्भ धारण करते ही यानी संयोग होते ही गाय को ४-५ पल्ले देना चाहिए । इसके लिए प्रथम गाय को जमीन पर लिटा दिया जाय और तत्पश्चात् उसको गुडीन्दि या पल्ले दिए जायें । इस प्रकार पल्ले देने से गर्भ रह जाता है । तत्पश्चात् :—



१. असली सिन्दूर	३ तोला
गाय का दूध	१० तोला
पीली मिट्टी	२ तोला
पानी	१० तोला

मिट्टी को पानी में घोलकर छान लेना और तत्पश्चात् सब को मिलाकर दे देना ।

२. घी	४० तोला
कत्था	१० तोला
केले की जड़ का रस	१० तोला

सब को मिलाकर देना चाहिए ।

### खान-पान

जानवर को उत्तेजक पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए ।

३. गाय के कान थोड़े थोड़े काट देना चाहिए उस से वह दुबली होकर गर्भ धारणा कर सकती है ।

## हड्डी पर चोट लगना और टूट जाना

### कारण

निम्नलिखित कारणों से हड्डी टूट जाती है ।

हड्डी पर अचानक घातक चोट लगना ।

पत्थर या लाठी का घातक मार लगना ।

जानवरों के आपस में लड़ने से एवं पैर फिसल जाने से अकसर हड्डी टूट जाती है ।

### लक्षण

जहाँ से हड्डी टूट जाती है वहाँ दर्द होता है और सूजन आ जाती हिलाने पर कट कट आवाज आती है । टूटी जगह को इधर-उधर घूमा जा सकता है ।

## इलाज

१. सर्व प्रथम हड्डी को यथा स्थान शीघ्र जमा देना चाहिए। तिनस की अन्तर छाल बारीक पीस उसमें गोमूत्र मिला कपड़े की पट्टी के ऊपर २ सूत मोटा लेप लगाकर वह टूटे स्थान पर बांध देना चाहिए तत्पश्चात् बांस की खमचियां मुलायम डोरे से टूटे स्थान पर कसकर बांध देना चाहिए। खमचियों को कपड़ा लपेट लेना चाहिए। मुलायम डोरे के लिए सन के बारीक डोरे उपयोग में लाये जा सकते हैं। पट्टी बांधने के बाद पट्टी पर दिन में २ बार खूब गोमूत्र छिड़कना चाहिए और इस प्रकार सदैव पट्टी को तर रखना चाहिए। यह पट्टी १ मास तक टूटे स्थान पर यथावत् बंधी रहनी चाहिए। पट्टी बांधने के बाद अगर टूटे स्थान से दुर्गन्ध आने लगे तो पट्टी खोलकर नीम के पानी से घाव को खूब धोना चाहिए। तत्पश्चात् पुनः उपर्युक्त विधि से पट्टी बांध देना चाहिए। पट्टी बदलते समय सब चीजें नई ली जानी चाहिए।

नोट :—प्लास्टर का कपड़ा आवश्यकतानुसार लम्बा और गोलाई में पैर की गोलाई से सबाया हो। खमचियां कपड़े से २ इंच छोटी होना चाहिए।

१. टूटे स्थान पर केवल खमचियां बांध देने से भी हड्डी जुड़ती है।

२. तेल सिन्दूर को मिलाना चाहिए और टूटे स्थान पर लगाना बाद में वहाँ आदमी के बाल रखना चाहिए। उनपर पट्टी बांधना चाहिए। और बाद में हररोज सुबह और शाम को तेल ५ तोला डालना चाहिए। तेल अलसी का ही उपयोग में लाना चाहिए।

(४) ईंट से बांधना :

प्रथम पक्की ईंट को चूर्ण सहस्र बना लेना चाहिये और तत्पश्चात् कपड़े के दो तह लगाकर बुरादे को उस में भर लेना एवं टूटे स्थान पर

मुलायम डोरी से कस कर बांध देना चाहिये । इस के बाद ऊपर लचलची खमचियां बांध देना चाहिये । इस प्रकार बांधने के बाद दिन में १ बार उस पर नीमका पानी छीटना और १ बार तेल खोपरे का छीटना चाहिये । इस पट्टी को भी उपर्युक्त प्रकार से करीब १ मास तक बंधी रखना चाहिये ।

(५) केवल दूटे स्थान पर कपड़े की पट्टी बांध देने से भी हड्डी मली प्रकार जुड़ जाती है । खमचियां ऊपर लिखानुसार अच्छी होनी चाहिये ।

(६) इस के अलावा जिस जानवर की हड्डी टूट जाय उसको नीचे लिखी दवाइयां खाने को देना चाहिये ।

[क] झिनझिनी की जड़ की छाल १० तोला

गौदुग्ध ४० तोला

बारीक पीस कर जड़ को दुग्ध में मिला लेना चाहिये और सुबह शाम इसी मात्रा में ५ दिन तक जानवर को देना चाहिये । इसके बाद में,

[ख] हाड़ जोड़ हरी २५ तोला

गौदुग्ध ४० तोला

हाड़ जोड़ को कूटना चाहिये और दूध से धोकर निचोड़ लेना और कुत्त्रा फेंक देना चाहिये । इस प्रकार ३ बार करना चाहिये । यह दवा ४ दिन तक पिलाना चाहिये । इस के बाद,

[ग] गिरदान की जड़ २ तोला

गोधृत २० तोला

गिरदान की जड़ को बारीक पीस लेना चाहिये और धोको गर्म कर उसमें मिला लेना चाहिये । ८ दिन तक पिलाना चाहिये इस के बाद,

[घ] चिर्गोजी की जड़ २० तोला

दुग्ध ४० तोला

जड़ कूटना और दूध से धोकर निचोड़ लेना । इस तरह कई बार करना चाहिये । ६ दिन तक यह दवा पिलाना चाहिये । उस के बाद,

[ड] धामण की जड़ २० तोला

गोदुग्ध ४० तोला

चिरौंजी की जड़ की भांति । यह दवा ८ दिन तक पिलाना चाहिये । इस के बाद:—

[च] सियाल ब्रेठनिया का तुरा ३ तोला

गाय घी २० तोला

तुरे को चारीक बांट लेना और घी में मिलाकर ८ दिन देना चाहिए ।

इन दवाइयों में से कोई चीज न मिले तो कोई भी एक दवाई १ मास तक देते रहने से भी काम चलता है ।

### खान-पान

जानवर को पौष्टिक दाना देना चाहिए (अलसी, उड़द, गेहूँ, चन सोयाबिन खसखस की खली आदि) १ मास तक देना ।

बबूल की फली अवश्य खिलाना चाहिए ।

बांधने का स्थान कच्चा हो ।

हड्डी जोड़ते समय जोड़ने से पूर्व १० तोला शराब पिला देने से उसे दर्द मादम नहीं होगा ।

(८) तेल और शक्कर भी खिलाई जा सकती है ।

(९) दूध ८० तोला (हो सके वहाँ तक भेड़ का दूध काम में लावें) ।

गुड़ २० तोला

गुड़ दूध में डालकर पिलाने से खून बढ़ता है व हड्डी इन्हें में मदद पहुँचाता है । दूध एक मास तक दरावर पिलाते रहना चाहिए ।

गांगड़ा १ तोला

आम्बाहल्दी २ तोला

तेल अलसी २० तोला

मिलाकर मशुको करीब १० दिन तक पिलाया जाय

# हड्डी टूट कर बाहर आ जाना

(कम्पौण्ड फ्रेक्चर)

## कारण

ऊपर लिखानुसार

## लक्षण

ऊपर लिखानुसार

## इलाज

सर्व प्रथम अगर हड्डी बाहर निकल आई हो तो ठीक ढंग से हड्डी को अन्दर बिठा देना चाहिए। चमड़े को चीरकर भी अन्दर बिठा सकते हैं तत्पश्चात् तिनछ की अन्तर छाल को खूब बारीक पीस कर कपड़े से छान लेना चाहिए। इस के बाद ऊपर लिखेनुसार पट्टी बांधना चाहिए और हर आठवें दिन पट्टी बदल देना चाहिए। अगर पीछे का पैर हो और जंघा पर से टूटा हो तो खपचियां ३-३ इंच लम्बी लेना चाहिए। कपड़ा खपचियों से १ इंच लम्बा लेना चाहिए।

अगर पैर घुटने के ऊपरी हिस्से में से टूटा हो तो पूरे पैर के बराबर कपड़ा और खपचियां लें। साथ ही पट्टी बांधने के पहिले टाट की दो लिपटी हुई १-१ इंच गोलाई की पाटियां टोच पर रखें।

इन पाटियों को मोड़ पर या टोच पर दोनों तरफ समानान्तर रखना चाहिए।

इस के बाद पास ही खपचियां बांधना चाहिए। पट्टी को ५ जगह से बांधना चाहिए। सनकी रस्सी से। खपचियां लचने वाली होना चाहिए तथा उनके ऊपर भी कपड़ा लपेट लेना चाहिए।

## पिलाने की दवाइयां

ऊपर लिखी सब दवाइयां उपयोग में लाना चाहिए।

## खान पान

प्रतिदिन दुग्ध १ सेर और गुड़ २० तोला मिलाकर पिलाना ।

अलसी का तेर २० तोला और शक्कर २० तोला मिलाकर पिलाना ।

बबूल की हरी पत्तियां या अगर फलियां मिल सकें तो फलियां जानवर को अवश्य खिलाना ।

दाने के लिए उड़द, सोयाबीन, चने की दाल, गन्ना, तिल्ली की ताजा खली और खसखस की खली उपयोग में लाना ।

## हड्डी का जोड़ से सरकना तथा मोच आना

### कारण

जानवरों को अत्यधिक जोर से दौड़ाना । कौचड़-युक्त भूमि पर पैर फिसल जाना । जानवरों का आपस में लड़ना । इसके अलावा कभी कभी डामर की सड़कों पर भी जानवर का पैर फिसल जाता है और हड्डी सरक जाती है ।

### लक्षण

जिस स्थान से हड्डी उतर जाती है वहाँ जोर का दर्द होता है और उस स्थान पर सूजन आ जाती है । उतरा हुआ हिस्सा दूसरे हिस्से से बड़ा हुआ और टेढ़ा दिखाई देता है । जानवर लंगड़ता है ।

### इलाज

जिस जानवर की हड्डी उतर जाय उसको प्रथम जमीन पर लिटा दो । उतरा हुआ पैर ऊपर रहना चाहिए । हड्डी उतरे पैर को छोड़ शेष तीनों पैरों को बांध दो ।

अब अगर फर्रे (जांघ) की हड्डी उतरी हो तो जानवर के खुर के पास पहुंचे में रस्सी बांधकर, उस रस्सी में दो हाथ की दूरी पर एक डण्डा बांध डण्डे को पकड़ लो। डण्डे को २ आदमी पकड़ें और खींचते रहें। फिर उसी पैर के नीचे जांघ के पास एक मूसल जिसके बीच में थोड़ा कपड़ा बंधा हो—रखकर जानवर की पीठ की ओर खड़ा होकर दोनों हाथों से मूसल—(गोल लकड़ी अच्छी मोटी हो) को पकड़ एकदम झटका देना। झटका देते ही उतरी हुई हड्डी “खट” से आवाज करके यथास्थान आ जायगी। जब तक ऐसी आवाज न हो जाय; दो चार झटके देना चाहिए। हड्डी यथास्थान आ जाय तब जानवर को खड़ा कर दो।

यदि हड्डी को उतरे अधिक दिन हो गए हों तो प्रथम उस स्थान पर मुजाल या वक्राण का नमक मिश्रित गर्म पानी छिड़कना चाहिए और पश्चात् हड्डी को ऊपर लिखानुसार ठिठाना चाहिए।

इतने पर भी अगर हड्डी यथास्थान न बैठे तो अन्तिम इलाज दाग लगाने का है।

दाग लगाने से पूर्व एक बार नीचे लिखा प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए और इसके बाद भी अगर आराम न हो तो फिर दाग लगाना चाहिए।

### प्रयोग

जिस जगह दाग लगाना हो वहाँ निशान बना लेना। तत्पश्चात् आक का दुग्ध, तिल्ली का तेल और सिन्दूर समान भाग मिला लेना चाहिए। इस मिश्रण को लकड़ी या फाए से निशानों पर लगाना चाहिए। यह मिश्रण दाग का कार्य करेगा। यह मिश्रण लगाने के १५ दिन पश्चात् उस स्थान पर खोपरे का तेल लगा देना चाहिए। इस से घाव ठीक हो जायगा।

## दागना

१. जांघ की हड्डी उतर जाने पर पिछले पैर के कूल्हे पर अंग्रेजी भापा का आठ का अङ्क बनाकर मध्य में दो आड़ी लाइनें बना देना चाहिए। अंग्रेजी आठ का अङ्क १ फीट लम्बा और ६ इंच चौड़ा बनाना चाहिए।

इस प्रकार निशान बनाकर गर्म लोहे या दांतली से दाग देना चाहिए। ऊपर लिखे प्रयोग में भी इसी प्रकार निशान बनाना चाहिए। दाग लगाने के बाद दागों पर खोपरे का तेल लगाना चाहिए और बाद में एक बार पुनः गर्म लोहा निशानों पर फेर देना चाहिए। इस से दाग अच्छे लगेंगे।

२. अगले पैर का फर्ा खिसकने पर उलटा खजुरा — इस प्रकार का निशान पशु की खदौल के २ इंच नीचे से नकली तक डेढ़ फीट खड़ी लाईन खींचकर ६-६ इंच की आमने-सामने लाइनें खींचना और उनपर दाग लगा देना।

३. अगले पैरों की नकली उतर जाने पर प्रथम नीम की हरी सलाइयां लाकर उनके पत्ते तोड़ देना और उनपर होनेवाला बारीक छिलका उतार देना। तत्पश्चात् जानवर का मुँह चौड़ा करना और उसके नाक के स्वरो में पूरी सलाइयां भर देना। सलाइयों को निकालना नहीं चाहिए। इस प्रयोग से ८-१० दिन में नकली अवश्य ब्रेट जायगी। यदि न ब्रेट तो दाग नकली पर लगाना चाहिए। इस वृत्त की लम्बाई चौड़ाई ६ इंच की होना चाहिए। इस से भी आराम न हो तो फिर उसी दाग पर दाग लगा देना चाहिए।



## झटका लगाना

### कारण

हल; गाड़ी एवं वज्रन खींचने वाले जानवरों के अक्सर झटका लगा जाता है। सामान्यतया बैलों को झटका अधिक लगता है।

### लक्षण

झटका लगते ही जानवर का कोया बाहर निकल आता है। आँख में से आँसू गिरने लगते हैं। अत्यधिक जोर का झटका लगने पर जानवर की रीढ़ की हड्डी पर असर होता है। रीढ़ की हड्डी पर असर होने पर अगर रीढ़ पर हाथ रक्खा जाय तो जानवर झुक जाता है। झटके का सबसे ज्यादा असर गर्दन पर होता है। गर्दन अकड़ जाती है। गर्दन पर वज्रन रखते ही जानवर बैठ जाता है।


झटका लगने के बाद अगर बहुत जल्दी ही इलाज नहीं कराया जाय तो जानवर धीरे धीरे बहुत ही कमजोर हो जाता है।

### इलाज

(१) नमक १ तोला

बासीपानी ८०

दोनों को मिलाकर कुनकुना गर्म कर लेना चाहिए और जानवर की आँख पर दिनमें २ बार ७-८ दिन तक छींटना चाहिए। पानी को गर्म कर छान लेना चाहिए।

(२) दागना:— अगर इससे भी आराम न हो तो फिर दाग लगाना चाहिए। दाग कोया निकली हुई आँख के मोहों के ऊपरी भाग में ३ इंच लम्बा  इस तरह का गोल दाग लगाना चाहिए।

रीढ़ को हड्डी पर असर होने पर:—

(१) गौ दुग्ध ८० तोला

सैंधा नमक बारीक १५ तोला

दोनों को मिलाकर शीघ्र प्रातःकाल जानवर को पिला देना चाहिए।

(२) मेथी ४० तोला

छाछ १२० तोला

दोनों को मिलाकर दिनमें १ बार १५ दिन तक जानवर को पिलाना चाहिए। गर्दन के असर पर विशेष लाभकारी है।

(३) फिटकरी ५ तोला

काला नमक ५ तोला

सर्ज्जी १३ तोला

आम्बा इल्दी ५ तोला

ढाढ़ण के बीज ५ तोला

पानी १२० तोला

सबको महीन पीस कर पानी या पानी के बजाय छाछ में मिलाकर जानवर को पिला देना चाहिए। यह दवाई सुबह-शाम दोनों समय पिलानी चाहिए।

(४) दागना:— आराम नहीं होने पर त्रैल की पीठ पर पानी की कोख से घास की कोख तक दो आड़े दाग करीबन १-१ फुट लम्बे लग देना चाहिए।

### खान-पान

बोमार जानवर को दवाई देने के बाद ५ घण्टे तक चारा-दाना और पानी नहीं देना चाहिए। जानवर को हल्की, पतली और पोषक खुराक देना चाहिए। मुलायम घास खाने को दें। स्वच्छ जल कुएँ का पिलाना चाहिए।

## पसली टूट जाना

### कारण

कभी कभी जानवरों के परस्पर लड़ने से एवं पसलियों पर अचानक घातक चोट लग जाने से उनकी पसली टूट जाती है। अगर पसली टूट जाय तो निम्न लिखित इलाज करना चाहिए :—

### इलाज

#### (१) नीम की पत्तियाँ

नमक

पानी

आवश्यकतानुसार मिलाकर उबालना चाहिए और सेक करना चाहिए।

#### (२) मुजाबल की पत्तियाँ

नीम की पत्तियाँ

निर्गुण्डी की पत्तियाँ

नमक

पानी

सबको मिलाकर उबालना चाहिए और सेक करना चाहिए।

#### (३) तिनछ की छाल का चूर्ण

गौमूत्र

दोनों को मिलाकर टूटे स्थान पर पट्टी बांधना चाहिए।

#### (४) सूरजमुखी के बीज

नमक

पानी

बारीक पीसकर सबको मिला लेना चाहिए और पट्टी बांधना चाहिए।

(५) जहाँ से पसली टूट गई हो उसपर ⊕ इस प्रकार का दाग लगा देना चाहिए ।

## कमर का टूट जाना

जानवर अक्सर अचानक गिर पड़ते हैं और उनकी कमर पर भारी आघात पहुँचता है । इस प्रकार कभी कभी कमर टूट भी जाती है ।

## इलाज

सर्व प्रथम जानवर को किसी के सहारे रस्सियों का और टाट का सहारा देकर खड़ा रखना चाहिए ।

पिलाने के लिए नीचे लिखी औषधियाँ देना चाहिए ।

(१) दही १२० तोला

मसूर की जली हुई दाल ४० तोला

मिलाकर जानवर को पिलाना चाहिए । यह दवा करीब ४ दिन तक पिलाना चाहिए ।

(२) दही १२० तोला

गुड़ ४० तोला

दोनों को मिलाकर जानवर को पिलाना चाहिए ।

(३) गौ दुग्ध ८० तोला

गुड़ ४० ,,

मिलाकर पिला दें ।

(४) चापड़ी की जड़ ४० तोला

गौ दुग्ध ८० ,,

मिलाकर पिला दें ।

(५) घामण की जड़ ४० तोला

गौ दुग्ध ८० ,,

गुड़ ४० ,,

मिलाकर पिला दें ।

## खुर-मोच या खुर चड़क

कभी कभी जानवरों का खुर चड़क जाता है या खुर में मोच आ जाती है ।

### इलाज

१. ढाकणी के इलाज में लिखेनुसार चने बांधना ।
२. दाग लगाना ।
३. मोच पर तिनछ की अन्तर छाल का चूर्ण बांधना और उपर गौमूत्र डालना ।

## आगे के पैर की ढाकणी खिसक जाना

परस्पर लड़ने, घातक चोट लगने, दौड़ने एवं फिसल जाने से कभी कभी ढाकणी खिसक जाती है । नीचे लिखे उपाय उपयोग में लाना चाहिए ।

### इलाज

१. ढाकणी पर किसी अच्छे मजबूत कपड़े में सूखे चने बांधना चाहिए और चनों पर दिन में खूब पानी छीटना चाहिए । चने फूलेंगे और ढाकणी यथास्थान आ जायगी । चनों को खूब मजबूत बांधना चाहिए ।
२. दागना :—इसके अलावा अगर चनों का प्रयोग करने पर भी ढाकणी यथास्थान न आए तो तत्पश्चात् दाग लगाना चाहिए ।

## सींग टूट जाना

### इलाज

१. घेल फल का गूदा  
सिन्दूर  
तेल अलसी

तीनों को मिलाकर सींग में भर दें। तत्पश्चात् ऊपर आदमी के बाल रगड़कर पट्टी बांध दें।

२. सिसेण्ट

पानी आवश्यकतानुसार लेकर मिला लेना चाहिए और सींग में भर देना चाहिए।

३. बबूल का गोंद

सिन्दूर

तेल अलसी

तीनों को मिलाकर सींग में भर दें।

४. तिनछ की अन्तर छाल का बारीक चूर्ण भरना चाहिए।

## कमेडी (कैंसर)

### कारण

अक्सर कभी कभी जानवर के सींग में छेद हो जाता है और छेद हो जाने के पश्चात् सींग में धीरे धीरे पानी उतरता रहता है। इस तरह पानी उतरता रहता है और सींग के अन्दर सड़ान उत्पन्न होती रहती है। इलाज नहीं करने पर कुछ समय बाद सड़ान भयङ्कर रूप धारण कर लेती है और सींग में कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। कई लोग सींग में कैंसर-रोग होने का कारण एक प्रकार का कीड़ा मानते हैं जो कि अन्दर चला जाता है और कैंसर पैदा हो जाता है।

### लक्षण

सींग में सड़ान उत्पन्न हो जाती है।

सींग को दबाने पर कुछ कुछ दौला सादम पड़ता है।

अगर रातको सींगों को पकड़कर खूँटा जाय तो जिस सींग में जड़ान पैदा हुई होगी यानी कैंसर उत्पन्न हुआ होगा वह गर्म मालूम पड़ेगा । जानवर अपना सिर ठोकता है ।

जिस सींग में कैंसर पैदा हो जाता है वह नीचे से मोटा बनता जाता है और धीरे धीरे झुकता जाता है । पक्षा पहिचान के लिए दोनों सींगों की नोकों पर से दोनों सींगों के मध्य की दूरी डोर से नाप लेना चाहिए और नापने के बाद ८ दिन पश्चात् पुनः नापना चाहिए । अगर कैंसर होगा तो मध्य की दूरी बढ़ जायगी । कैंसर ३ दर्जों में अपना पूरा रूप धारण करता है । अन्तिम रूप धारण कर लेने पर इलाज हो सकना असंभव है । इलाज भी दर्जों के अनुसार ही करना चाहिए ।

### पहला दर्जा

१. सर्व प्रथम अगर रोग लगा ही हो तो सींग को काटकर उसमें का पानी निकाल देना चाहिए और अन्दर तीसरे दिन १ रत्ती सोमल भर देना चाहिए ।

२. खरगोश की लेंही आधी या  $\frac{1}{2}$  तोला आटे में मिलाकर जानवर को खिलाना चाहिए ।

३. दागना :—अगर दाँएँ सींग में रोग हो तो बाँएँ पुट्टे पर अँग्रेजी के आठ ८ के समान दाग लगाना चाहिए ।

रोग बाँएँ सींग में हो तो इसी प्रकार दाँएँ पुट्टे पर दाग लगाना चाहिए ।

### दूसरा दर्जा

(१) सींग को जड़ से १ इंच ऊपर से काट कर फेक दें और नर्म की पत्ती के उबले पानी से धोना चाहिए । अगर अधिक सूख

निकले तो दरांती से दाग लगा देना चाहिए। तत्पश्चात् ऊपर रुई रखकर पट्टी बांध देना चाहिए। इस के बाद पट्टी को तीसरे दिन खोलना चाहिए और नीम के पानी से खूब धोना चाहिए। धोकर सोमल १ रत्ती उस में भर देना चाहिए। क्रमशः इसी तरह कुछ दिन करना चाहिए।

### तीसरा दर्जा

इस दर्जे में कान एवं आँख पर सूजन आ जाती है। अगर अन्दर से पीप निकलती हो तो प्रतिदिन नियमित धोना चाहिए और धोकर २ रत्ती सोमल अन्दर भरना चाहिए और ऊपर भूरीरीगणी का डाट लगा देना चाहिए। डाट लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। पट्टी पर खोपरे का तेल और डीकामाली लगा देना चाहिए।

मोर के पंख जले हुए और खोपरे का तेल भी मिलाकर लगा सकते हैं। इस से जखम पर मक्खी नहीं बैठेगी और कीड़े नहीं पड़ सकेंगे।

### कठामी (ट्यूमर)

#### कारण

यह रोग अक्सर वर्षा एवं सर्द ऋतु में होता है। वो जानवर रात-दिन खुली जगह में ही रहता है उसको भी यह रोग हो जाता है। साधारण तथा रक्त विकार के कारण यह रोग उत्पन्न होता है।

#### लक्षण

यह रोग गले या कण्ठ पर होता है।

कंठ या गले पर जहर बात से मिलता जुटता एक गाँठ पैदा होती है। गाँठ प्रथम बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है। गाँठ गोल और लम्बाई में अधिक होती है। यदि जानवर को यह रोग



हो जाय और समय पर इलाज न हो सकने के कारण गांठ पक जाय तो तत्पश्चात् जीवन भर यह रोग जानवर को सताता रहता है। गांठ पकती है और फूटती रहती है। क्रमशः यही क्रम चलता रहता है।

## इलाज

(१) नीम के पत्तों से सेकना। नीम के पत्ते और थोड़ा नमक मिलाकर उबाल लेना और कुन-कुने पानी से गांठ पर सेक करना चाहिए।

(२) ईंट को गर्म करना चाहिए और उससे गांठको सेकना चाहिए। ईंट से सेक करने के बाद नीचे लिखा लेप गांठ पर लगाना चाहिए।

लेप:—

आम्बाहल्दी

फिटकरी

काला नमक

नई कन्द

खोपरे का तेल

सबको बारीक पीस गर्म कर लें और गांठ पर लेप करें।

(३) अगर इस के लेप से भी गांठ ठीक न हो तो लोहे का एक सूया गर्म करके गांठ में धुसेड़ देना चाहिये। गांठ में धुसेड़ने से अन्दर की विषैली वायु बाहर निकल जायगी और गांठ ठीक हो जायगी।

(४) इतने पर भी रोग ठीक न हो तो X इस तरह का गांठ पर दाग लगाना चाहिए।

## आँख का फूला

आँख में बाहरी कोई वस्तु चली जाने एवं चोट लग जाने से जानवरों की आँखों में फूला बन जाता है। फूला बन जाने पर आँख से

दिखाई नहीं देता है और आंख बिल्कुल खराब हो जाती है। आंख में फूला बनते ही उसका इलाज तुरन्त करना चाहिए, वरना बाद में इलाज हो सकना असम्भव है।

## इलाज

(१) फूला बनते ही जानवर के आंख की कनपटी पर चाकू से खरौंचकर वहां के बाल उखाड़ देना चाहिए और तदन्तरात् उस जगह ३-४ दिन तक लगातार चम्पाध्वर का दुग्ध लगाना चाहिए। आंख के अन्दर उबला हुआ नमक और तम्बाकू मिश्रित पानी छान कर ढालना चाहिए।

(२) लाल मिर्च को खूब बारीक पीस कर घी के साथ आंख में आंजना चाहिए।

जानवर को तकलीफ तो होगी परन्तु आराम अवश्य ही जायगा।

(३) सांभर सींग पानी में घिसा हुआ

निम्बू का रस

मक्खन

कीमिया सिन्दूर


इनको मिलाकर आंख में आंजना चाहिए।

(४) गुराड़ की जड़ को पानी में घिस कर आंख में आंजना चाहिए।

(५) दागना:—

इस में दाग तीन प्रकार के लगाये जाते हैं :—

प्रथम:—सिर पर जहां गड़ढा होता है वहां बोची पर आड़ा दाग लगाना चाहिए। दाग ४ इंच लम्बा लगाना चाहिए।

द्वितीय:—आंख के भौंहों के ऊपर  इस प्रकार का दाग लगाना चाहिए।

तृतीयः—तीसरा दाग पूरी आँख के चारों ओर लगता । दाग

○ इस प्रकार लगाना चाहिए ।

इन में से कोई भी एक दाग लगाना चाहिए ।

इस के अलावा आँख के भौंहों पर केवल तीन जगह छोटे छोटे दाग लगा देने से भी काम चल सकता है ।

## आँख में जाला

जाला एक प्रकार के कीड़े के कारण आँख में पैदा होता है । जाला बनते ही बहुत जल्दी इलाज करना चाहिए ।

### इलाज

(१) काला नमक और पानी को उबालना चाहिए और छानकर कुनकुना आँख पर छोटना चाहिए ।

(२) नीम के पत्ते, पानी और नमक को उबालना और छानकर आँख पर छिड़कना चाहिए ।

(३) तम्बाकू, चूना और पानी मिलाकर उबालकर सड़ाना तत्पश्चात् छानकर आँख पर छोटना चाहिए ।

(४) दही और अफीम मिलाकर आँख में आजना चाहिए ।

(५) असगन्ध को पानी में घिसकर आँख में आज दें ।

(६) नईकन्द को पानी में घिसकर आँख में आज दें ।

(७) असगन्ध और नईकन्द को निम्बू के रस में घिसकर आँजने से भी फायदा होता है ।

## रक्त-प्रदर

जानवर को व्याने के पश्चात् चारा-दाना देने में गड़बड़ी होने से यह रोग कभी कभी लग जाता है । साधारणतः जनने के बाद अत्यधिक गर्म वस्तुएँ जानवरों को खिलाने से भी यह रोग हो सकता है ।

## इलाज

(१) दही ४० तोला

घृतकुमारी का गुदा ४० ,,

दोनों को मिलाकर दोनों समय जानवर को दें ।

(२) सौंरा मरमर के पत्ते १६० तोला

पानी २० सेर

पत्तों को चारीक पीस लें । पश्चात् खूब उबालना चाहिए । कुछ पानी जानवर को पिलाना चाहिए और शेष पानी से जानवर को स्नान कराना चाहिए ।

## खान-पान

जानवर को चारा-दाना में हल्की, पतली और पोषक एवं ठण्डी वस्तु खाने को दें ।

## सूर की बीमारी

यह रोग भैंस वर्ग में ही होता है । गर्मियों की अधिकता के कारण यह रोग उत्पन्न होता है । भैंस व भैंस के बच्चों को ठीक समय पर पानी नहीं मिलने से यह बीमारी होती है । कभी कभी अत्यधिक गर्म पानी पीने से यह रोग हो जाता है ।

## लक्षण

मुँह के अन्दर के दोनों स्वर-जिनका सम्बन्ध नाक के दोनों नथुनों से एवं मस्तिष्क से होता है—अन्दर से चौड़े हो जाते हैं । पानी नहीं पिया जाता । पानी पीने पर नाक से गिरता है ।

## इलाज

(१) सिन्दूर

मक्खन

रुई (बहुत कम मात्रा में)

तीनों को मिला लें ।

पश्चात् गौतमी घास की कांडी लेकर उपर्युक्त मिश्रण उसके सिर पर लगा लें। इसके बाद जानवर को जमीन पर लिटा लेना चाहिए और सावधानी से दोनों स्वरो में दो कांडीयें आधा इंच अन्दर जाने देकर तोड़ लें। अवश्य आराम होगा। यह क्रिया कुछ दिन निरन्तर करना चाहिए।

## खान-पान

जानवर को कमजोर न होने देना चाहिए।

मुलायम हरी घास खाने को दें।

## डेंडकी रोग

केवल गाम बैलों को ही यह रोग होता है। ठण्ड और गर्म काल में ही यह रोग उत्पन्न होता है।

जिह्वा के ऊपर कण्ठ में जो कौए लटके रहते हैं, उस से बाहर ही जिह्वा पर सूखा या कटेला घास खाने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है।

## लक्षण

जिह्वा पर एक घाव हो जाता है।

घाव में से नापसन्द दुर्गन्ध आती है।

## इलाज

१. प्रथम घाव को साफ कर नीम के पानी से धो दें।

२. इसके बाद उसमें नमक भरें। तीन दिन पश्चात् घाव को साफ कर उसमें मिस्सी भर दें।

३. मिस्सी न मिल सके तो तवाखार (तवकी) धी में मिलाकर प्रतिदिन भरना चाहिए।

४. अन्तिम इलाज दागने का है। दाग बहुत मामूली लगाना चाहिए। सूजे हुए एवं उठे भाग को लोहा गर्म करके बहुत मामूली दागना चाहिए।

## इल रोग

यह बीमारी टण्ड काल में होती है। जानवर घास के साथ एक प्रकार का कीड़ा खा जाता है और यह रोग पैदा हो जाता है।

### लक्षण

जिन्हा के नीचे के भाग में चट्टे पड़ जाते हैं। चट्टे उत्पन्न होने के बाद अन्दर सड़ान पैदा होती है और सड़ान पैदा होते ही उसमें छोटे छोटे कई कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चित समय पर इलाज नहीं होने पर रोग बढ़ता ही जाता है।

### इलाज

१. फिटकरी	५ तोला
मिर्सी	५ तोला
हल्दी	५ तोला
मकान की झाड़न का धूसा	५ तोला

चारों को बारीक पीसकर एक शीशी में भर लें। दिन में ३ बार

इस मिश्रण को घाव पर भरना चाहिए।

२. सिर के ताल	$\frac{1}{2}$ तोला
गुड़	१ तोला

दोनों को मिला कर कूटकर एक टिकिया बना लें। जिन्हा को

उलटकर टिकिया घाव में रख देना चाहिए। बाद में बन्दूक के गज के सरी को गर्म करना चाहिए और उसको टिकिया पर लाल लाल रखना चाहिए। इससे गर्मी से अन्दर के कीड़े मर जावेंगे।

## पटाड़ी रोग

गर्मी के दिनों में यह रोग होता है। अधिक गर्म वस्तुएं खा जाने से अक्सर यह रोग ज्यादा होता है।

## लक्षण

पतले दस्त लगते हैं। मल बहुत ही दुर्गन्धयुक्त होता है। मल में से नापसन्द दुर्गन्ध आती है। मल में चिकनाई नहीं होती। मल के साथ कभी कभी रक्त भी आता है। अन्त में आँते गिरने लगती है।

## इलाज

१. अरणी की हरी पत्तियाँ ३० तोला

टण्डा पानी ६० तोला

पत्तों को पीस लें और जानवर को पानी में मिलाकर पिला दें।

२. नीम की पत्तियाँ ३० तोला

पत्तियों को पीसकर जानवर को पिला दें और बाह में ३० तोला घी पिला दें।

३. खजूर की जड़ का रस ५ तोला

अतावरी की हरी जड़ ५ तोला

पानी २० तोला

घारीक पीस पानी में मिला कर पिला दें।

४. गंग २ तोला

सौंफ ५ तोला

कपूर ३ तोला

बेल फल का गूदा ५ तोला

पानी २० तोला

घारीक पीस पानी में मिलाकर पिला दें।

५. शीशम की पत्तियाँ

पानी

घारीक पीस पानी में मिला पिला दें।

६. छाछ बघारा और

जली ज्वार छाछ के साथ जानवर को पिलावें ।

७. भंग और दही मिलाकर पिलावें ।

८. कढ़ी का गोंद

बेल फल गूदा

पानी

बारीक पीस छानकर जानवर को पिला दें ।

९. एर की जड़

हाथी का लेण्डा

मसूर की जली दाल

सब को बारीक पीस छाछ के साथ पिलावें ।

## खान-पान

जानवर को हल्की पतली और पोषक खुराक दें ।

## कन्धे में गांठ होना

बैलों के कन्धे में अक्सर जोतने में गलती करने के कारण गांठ उत्पन्न हो जाया करती है । गांठ हो जाय तो निम्न लिखित उपाय काम में लाना चाहिए ।

(१) गांठ को ईंट से सेकना चाहिए ।

(२) सोंग दराद और आम चूल का तेल मिलाकर लगाना चाहिए

(३) आक का दूध और अलसी का तेल मिलाकर लगावें ।

(४) आगिया पौधा और दुग्ध मिलाकर पिलावें ।

(५) आक की जड़ पीस कर आटे के साथ खिलावें ।

(६) बोची पर—सिर पर गइटे के पास—चाकू से छील आक का दूध लगावें ।

(७) अन्त में गांठ पर दाग लगाना चाहिए ।



## कन्धा तिड़कना

निम्न लिखित उपाय काम में लाये जायँ :—

- (१) आमचूल का तेल और  
सींग दराद मिलाकर लगाना चाहिए ।
- (२) स्नान करने का बड़िया साबुन और नील मिलाकर लगाना  
चाहिए ।
- (३) मक्खन और नमक मिलाकर लगावें ।
- (४) रतन जौत का दूध लगावें ।
- (५) खोपरे का तेल लगावें ।
- (६) मिस्सी और तेल नीम का मिलाकर लगावें ।
- (७) अन्त में दाग लगाना चाहिए ।

## हाथी पगा

### आंखों की सूजन

यह सूजन पूरे मुँह, कान और सिर पर फैल जाती है ।

### इलाज

प्रथम जानवर के कान आंखों के बराबर ले जाकर मिला लेना चाहिए । तत्पश्चात् दोनों कानों के सिरों को काट कर निकलने वाला रक्त दोनों आंखों में आजना चाहिए ।

## जानवर का अकड़ जाना

ठण्ड लगने के कारण एवं अन्य कारणों से कभी कभी जानवर अकड़ जाता है । उससे चला नहीं जाता है । अतः नीचे लिखे उपाय काम में लाना चाहिए ।

## इलाज

- (१) गुराड़ के वृक्ष की छाल ३ सेर  
पानी ५ सेर

काढ़ा बनाना चाहिए और जानवर को पिलाना चाहिए । तत्पश्चात् इसी छाल को ३-४ बार इसी तरह उबालना चाहिए और जानवर को देना चाहिए ।

## स्तन-फटना

कभी अधिक ठण्ड पड़ती है और हवा भी बहुत तेज चलती है । ऐसी स्थिति में अक्सर जानवरों के स्तन फट जाया करते हैं । कभी कभी बच्चे भी काट देते हैं । एवं तार आदि के लगने पर भी कट सकते हैं ।

## इलाज

(१) कोष्टा ४ लेकर जला लें और १ तोला मक्खन में मिलाकर मलहम बना लें ।

(२) असली शहद का मोम १ तोला लेकर १ तोला मक्खन में मिला लें और स्तनों पर लगावें ।

## स्तनों में फुन्सियां

### इलाज

- |           |        |
|-----------|--------|
| (१) हल्दी | १ तोला |
| सैंधा नमक | १ ”    |
| मक्खन     | ३ ”    |

बारीक पीसकर सबको मिला लें और लगावें ।

कभी कभी जानवर के स्तनों में से खून निकलने लगता है । ऐसी हालत में नीचे लिखे उपाय काम में लाना चाहिए :—

- (१) सुन्दर बेल को पीसकर जानवर को खिलाना चाहिए ।
- (२) नीम के पत्ते और नमक, पानी मिलाकर उबालना चाहिए और कुनकुने पानी से सेकना चाहिए ।
- (३) ओंघी जूती पर दुग्ध धारा मारना चाहिए ।
- (४) पत्थर चट्टी की धूनी देना चाहिए ।

## हिया बिलाय

### कारण

जानवर का अत्यधिक गर्म पदार्थ खाना । हृदय पर अकस्मात् चोट लग जाना । जानवर से अधिक परिश्रम लेना और एकदम पानी पिला देना । कभी कभी ऋतुपरिवर्तन के समय भी ऐसा होता है ।

### लक्षण

जानवर को साधारण ज्वर रहता है । श्वास की गति बढ़ जाती है और झटकेदार श्वास आता है । दस्तों के साथ मामूली खून भी कभी कभी आता है । जानवर छाया में खड़ा रहना पसन्द करता है । अधिक गर्मी में जानवर पानी में जाकर खड़ा रहता है । यह रोग फेफड़ों में पैदा होता है और फेफड़े सड़ जाते हैं । जानवर ये सब लक्षण दिन में प्रकट करता है ।

### इलाज

- (१) बदक या मुर्गी का अण्डा १  
गाय का दुग्ध ४० तोला  
दोनों को मथकर पिला दें । अण्डे का छिलका फेंक दें ।
- (२) नीम की पत्ती १० तोला  
गौ घृत ४० ”  
पत्तों को त्रारीक पीस लें और मिलाकर दें ।

(३) दही ८० तोला

शक्कर २० ,,

मिलाकर जानवर को पिला दें ।

(४) दही ८० तोला

प्याज का रस २० ,,

मिलाकर पिला दें ।

नोट:— अण्डे के लिए जहाँतक बन सके बंदक का अण्डा ही लेना चाहिए । बंदक का अण्डा विशेष फायदा करता है ।

### खान-पान

जानवर को गर्म वस्तुएँ नहीं खिलाना चाहिए ।

### तिड़ रोग

जानवर के शरीर से रक्त-धारा निकलना:— यह रोग गर्मी से पैदा होता है । इस रोग में शरीर के किसी भी भाग से अचानक रक्त-धारा बह निकलती है ।

### इलाज

(१) जानवर को ४० तोला गाय का घी प्रति तीसरे दिन तुबह पिलाना । इस तरह करीब ३३ सेर घी पिला दें ।

(२) कोष्टा ४

घी १० तोला

कोष्ठों को बारीक बांट लें और घी में मिला आटे के माथ जानवर को दे दें । यह दवाई एक सप्ताह तक नियमित पिलावें ।

(३) प्याज का रस १५ दिन तक पिलावें ।

प्याज १ सेर लेकर उसका रस निकाल लें ।

(४) रविवार के दिन कौओं को रोटी डालना और उनके मुँह से जो रोटी गिर जाय वह जानवर को खिलाना ।

(५) तिड़ को पकड़ना—रक्त-धारा को—और आटे में मिला जानवर को खिला देना ।

(६) अगर तिड़ में रहने वाले कीड़े को पकड़कर निकाला जा सके तो पकड़ कर निकालना चाहिए । कीड़ा अत्यन्त सूक्ष्म होता है । कीड़े का रंग श्वेत होता है । कई लोग इस रोग की उत्पत्ति का कारण एक प्रकार का कीड़ा बताते हैं । अतः पकड़ कर निकाला जा सके तो निकालना चाहिए ।

(७) जहाँ से रक्त-धारा निकलती है उस स्थान को सण्डसी से मजबूत षकड़ कर वहाँ दाग लगाना चाहिए । दाग लगाने से कीड़ा मर जायगा ।

## दुग्ध पीते बच्चों को दस्त लगाना

### कारण

- (१) अपचन
- (२) दुग्ध पीकर पानी भी लेना ।
- (३) अचानक चोट लगना ।

### इलाज

- |                |        |
|----------------|--------|
| (१) काली मिर्च | १ तोला |
| गाय का घी      | ५ ”    |

काली मिर्च को पीस लें और घी में मिलाकर दें ।

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| (२) महावृक्ष की छाल | ५ तोला |
| गाय का दुग्ध        | २० ”   |

छाल को पीसकर दुग्ध में मिला लें और छान कर पिलावें ।

(३) खाखर बेली का पूरा पौधा ३ तोला

छाछ २० „

बारीक पीस, छाछ में मिला; छानकर दें।

(४) छाछ बघारा ३ तोला

जली ज्वार २ „

छाछ २० „

बारीक पीस कर छाछ में मिला लें और पिला दें।

(५) जली ज्वार ३ तोला

छाछ २० „ मिलाकर दें।

(६) बच्चों की पूँछ पकड़ कर खींचना।

(७) बच्चों को सादड़ के पत्ते खिलाना चाहिए।

(८) भैंस के बच्चों के नाभि के पीछे के भाग में ३ इंच लम्बा-आड़ा दाग लगावें।

गाय के बछड़े-बछड़ियों के बछड़ी के योनि के नीचे और बछड़े के गुदा के नीचे दो इंच लम्बा दाग लगावें।

## फाँसी या छड़ रोग

### कारण

यह रोग भैंस वर्ग के जानवरों में ही अधिक होता है। साधारणतः अन्य प्रकार के जानवरों को यह रोग होता नहीं देखा गया है। पशुओं को ठीक समय पर पानी नहीं मिलने के कारण ही यह रोग होता है।

### लक्षण

जिह्वा के नीचे के हिस्से की नसों में काला रक्त भर जाता है। जानवर का शरीर अकड़ जाता है। खाना-पीना, जुगाली करना चन्द हो

जाता है। कमर के ऊपर दबाने से जानवर एकदम नीचे झुक जाता है। कान बिल्कुल ठण्डे पड़ जाते हैं। अक्सर दुधारू भैंसों को यह रोग विशेष होता है।

## इलाज

(अ) प्रथम भैंस को जमीन पर लिटा देना चाहिए। तत्पश्चात् उसकी जिह्वा बाहर निकालना और बड़ी दो नसों को जिनमें कि छोटी-छोटी नसें मिली रहती है—सुई से तोड़कर उनमें का काला रक्त निकाल दें। सुई से नस को तोड़कर दबाना चाहिए, काला रक्त निकल जायगा। इसके बाद जिह्वा पर नमक और हल्दी मिलाकर लगा देना चाहिए।

(ब) पूँछ के नीचे के भाग में थोड़ासा चीरा लगा देना और चीरा लगाकर पूँछ को खूब स्पंज करना—यानी दबाना। इस प्रकार दबाकर सब काला रक्त निकाल दें। काला खून निकल जाने के बाद चीरे हुए भाग पर अफीम लगा दें।

## आँख का कोया निकलना

### कारण

१. वजन खींचते समय झटका लगना।
२. जानवरों का आपस में लड़ना।
३. जानवर का ऊँचाई से गिर जाना।

### लक्षण

१. आँख का कोया बाहर आ जाना।

### इलाज

१. ठासी पानी और

नमक दोनों को गर्म करना और कुनकुना आँख पर छीटना।

२. आँख के भौहों पर दाग लगाना चाहिए।

## पागल कुत्ते या सियार का काट खाना

### लक्षण

पागल सियार या कुत्ते के काट खाने पर जानवर को जहर चढ़ता है। जानवर ३ दिन, ११ दिन, १ १/२ मास या १ १/२ वर्ष के बाद पागल होता है। अक्सर जानवर ३ दिन बाद पागल हो जाता है और १०-११ दिन में ही मर जाता है। पागल होने के बाद जानवर कुत्ते की भाँति चिड़चिड़ा लगता है।

### इलाज

१. काटे स्थान पर तत्काल गर्म लोहे का दाग लगाना चाहिए।
२. जंगली हजारे के १ फूल को पीसकर पानी के साथ दें। अगर हजारों हजारे हों तो उसका रस दें।

## जानवर को रतौंध आना

आँखों की कमजोरी के कारण जानवरों को रतौंध आती है।

### इलाज

१. जानवर को खूब रिजका घास खिलाना चाहिए।

२. द्राक्ष के बीज १० तोला  
 पुवाड़िया के बीज १० तोला  
 मेर्या के बीज १० तोला  
 सेंधा नमक ५ तोला

इनको पानी में पकाकर जानवर को दें। पहले सब वस्तुओं को बारीक पीस लें।

### खान-पान

जानवर को खूब पौष्टिक चारा-दाना दें।



## पूँछ का बाँड़ी रोग

रक्तमिश्रण में बाधा उपस्थित होने से यह रोग होता है। एक विशेष प्रकार के कीड़े के लग जाने का भी एक कारण है।

### इलाज

नल के समान मोले गोल लोहे से जानवर के चाँद पर दाग लगाता चाहिए।

२. पूँछ को ऊपर से रस्सी से बांध देना और बाद में रोग प्रसू स्थान को काट देना। तत्पश्चात् अफीम और तेल को गर्म करें और पूँछ को उसमें दाबकर सेक करें।

३. बकरी को पकड़ लेनेवाले भेड़िए का लैण्डा गर्म तेल में डालना और मलहम बना लेना और इस मलहम को पूँछ पर बांधना।

४. खोपरे का तेल और डीकामाली को गर्म कर कटे स्थान पर सेक करना चाहिए।

### कमजोर सांड को बलवान बनाना

नीचे लिखी दवाइयाँ देना चाहिए :—

१. खाने का कत्था ५ तोला

घी १५ तोला

मिलाकर इसी मात्रा में १ मास तक देना चाहिए।

२. तिल्ली का तेल २० तोला

शकर २० तोला

दोनों को मिलाकर इसी मात्रा में १ मास तक दें।

३. चने की दाल २ १/२ सेर

गाय का दूध २ सेर

गुड़ १ सेर

दाल को दूध में भिगोकर गुड़ मिलाकर दें। १ मास तक द।

## आग से जल जाना

४. डीकामाली और खोपरे का तेल लगावें ।

## जानवर के नजर लग जाना

### लक्षण

जानवर चिन्तित रहता है। कान ढोले पड़ जाते हैं। जन्म रूप पानी छोड़ देते हैं। दूध देने वाले जानवर दूध नहीं देते हैं।

## इलाज

- (१) जानवर को सुन्दर बेल १० तोला रोटी के साथ सुबह-शाम दें ।
- (२) बड़ड़ा के १५ फल नीले धागे में जानवर के गले में बांधें ।
- (३) पत्थर चट्टी और तेल मिलाकर घूनी दें

## माता का अपने बच्चे को भूल जाना

कभी कभी गाय जनने के बाद अपने बच्चे को भूल जाती है और उसको बूध पिलाना एवं उसको देखना, प्रेम करना छोड़ देती है ।

## इलाज

(१) मोर के अण्डों का ऊपरी छिलका १ रत्ती जानवर को रोटी के साथ दें । इस तरह करीब ५-१० दिन दें ।

(२) दही और नमक मिलाकर बच्चे के शरीर पर लपेट दें और उसको मादा के सम्मुख रखें । मादा बच्चे को चाटने लगेगी और प्रेम करने लग जायगी ।

(३) नमक और हल्दी दो-दो तोला लेना और इनको बारीक पीस बारीक कपड़े के टुकड़े में बांध लेना । इस पोटली को ५-६ हाथ लम्बी बारीक मुलायम डोर से बांध देना चाहिए ।

तत्पश्चात् हाथ के नाखून काट लेना, हाथ को चिकना कर लेना, और हाथ को योनि मार्ग से अन्दर डालना चाहिए । अन्दर पोटली को खूब पिराना चाहिए । कुछ समय बाद पोटली को निकाल लेना और निकाल कर पोटली और हाथ को एकदम बच्चे के शरीर पर पोंछ देना । बच्चे को मादा के मुँह के सम्मुख कर देना चाहिए । यह कार्य बहुत सावधानी और होशियारी से करना चाहिए ।

पोटली के डोरी इसलिए बांधते हैं कि अगर पोटली अन्दर हाथ से छूट जाय तो आसानी से निकाल सकें ।

## सांप का काट खाना

सांप के काटने पर जानवर के शरीर पर विष के कारण सूजन आ जाती है। सूजन मुँह की ओर से शुरू होती है और सारे शरीर पर फैल जाती है। इस के बाद शरीर पर जगह जगह चट्टे पड़ जाते हैं। चमड़ी जगह जगह से फट जाती है। जानवर का रक्त पानी जैसा बनकर बाहर निकलने लगता है।

### इलाज

(१) काटे हुए स्थान पर तत्काल दाग लगा दें।

(२) शिवलिङ्गी सूखी ८० तोला हरी १६० तोला

पानी २० सेर

शिवलिङ्गी को बारीक पीस कर पानी में मिला दें और थोड़ा पानी जानवर को पिलावें और शेष पानी से जानवर को स्नान करावें। जानवर को पिलाने के लिए शिवलिङ्गी का गाढ़ा घोल बनाना चाहिए।

(३) गूलर की छाल २० तोला

छाछ १ सेर

बारीक पीस छाछ में मिला लें और पिला दें।

कभी कभी जानवर को एक दूसरी किस्म का छोटा सांप काट खाता है। अतः उसके लिये निम्न लिखित उपाय काम में लाना चाहिये। ऊपर एक प्रकार के दिवड़ जाति के सर्प का इलाज बताया है।

(अ) गुराड़ की अन्तर छाल १० तोला

पानी ४० तोला

बारीक पीस पानी में मिलाकर पिला दें।

(ब) दाग लगावें।

अगर जानवर सर्प की कैचुली खा जाय तो निम्न लिखित इलाज करना चाहिए ।

(अ) लालमिर्च ४० तोला

सेंधा नमक २० तोला

इनको बारीक पीस कर थोड़े से पानी में ३ लड्डू बना लें और १२ घण्टे के अन्तर से एक एक खिलावें ।

(ब) जहर उतर जाने के बाद एवं दस्त बन्द होने के बाद जानवर को थोड़ा घृत भी पिलाया जाय

## शेर का जानवर को पकड़ लेना

शेर के दांत के धारों का जानवर पर अत्यधिक बुरा असर होता है । जहां-जहां दांत लगते हैं वहां-वहां सूजन आ जाती है । कुछ समय बाद सूजन पक जाती है और जानवर बहुत कष्ट पाता है ।

### इलाज

(अ) किरकड़िया की पत्तियां ८० तोला

पानी १० सेर

पत्तों को पीस लें और पानी में ढाल उत्रालें । कुछ पानी कम होने पर उतार लें और जखमों पर सेक करें ।

## बर्, भँवर या मधुमक्खी का काट खाना

(१) सर्व प्रथम काटे हुए स्थान के डंक या काँटे निकाल देना चाहिए ।

(२) घृत कुमारी का गूदा निकाल कर उसको शरीर पर लगाना चाहिए ।

(३) घी २० तोला

मिश्री १० तोला मिलाकर जानवर को पिलावें ।

## जानवर का दूध बढ़ाने के इलाज

जानवर को निम्न लिखित वस्तुएँ दें :—

(१) सहस्र मूली	२० तोला
गेहूँ का दलिया	८० तोला
पानी	३ सेर
गुड़	२० तोला

प्रथम सहस्र मूली को साफ करना चाहिए। ऊपर की पतली वक्षिल्ली एवं अन्दर के रेशे भी निकाल दें। तत्पश्चात् सब को पकाकर खिलाना चाहिए।

(२) असकन्ध की जड़	२० तोला
गेहूँ का दलिया	१ सेर
गुड़	३ सेर
पानी	३ सेर

ऊपर लिखानुसार दें।

### खान-पान

जानवर को पौष्टिक खुराक अधिक दें।

### जरूम को पकाना

(१) नहाने का अच्छा साबुन
हल्दी
नमक
पानी

सबको मिला पकाकर जरूम या दूजन पर बांध दें।

(२) नई कन्द

नमक

पानी

ऊपर लिखानुसार ऊपर बांधना चाहिए ।

(३) इसी तरह कलिंगड़ा, नमक और पानी या वैंगन, नमक और पानी मिलाकर गर्म करके बांधना चाहिए ।

(४) गेहूं का आटा और आक का दुग्ध गर्म करके बांध दें ।

(५) तेल

आक का दुग्ध । दोनों को मिलाकर लगावें ।

(६) जलम को पकने के बाद चूना, सजी अथवा तेल, आक का दूध अथवा कॉस्टिक सोडा लगाकर फोड़ सकते हैं ।

## जुएँ मारना

(१) तम्बाखू, सोडा चूना और पानी को मिलाकर गर्म करें और कुनकुने पानी से जानवर को स्नान करावें ।

(२) तम्बाखू, चूना, सोडा अफीम और पानी ऊपर लिखानुसार उपयोग में लावें ।

## बत्तीसा चूर्ण

१ दितौनी की जड़	२० तोला	६ धनिया	८० तोला
२ अमलताश का गूदा	८० ,,	७ सौंफ	८० ,,
३ पुवाड़िया के बीज	२०० ,,	८ कुटकी	८० ,,
४ अजवायन	८० ,,	९ चिरायता	८० ,,
५ जीरा	८० ,,	१० नौसादर	४० ,,

११ गौलन के बीज	२० तोला	३१ सैंठ	८० तोला
१२ वेवची	२०० ,,	३२ लौंग	४० ,,
१३ फिटकड़ा	८० ,,	३३ नावा	२० ,,
१४ आम्बाहल्दी	२०० ,,	३४ पलाश बीज	४० ,,
१५ सजी	८० ,,	३५ सनाय	८० ,,
१६ काला नमक	१६० ,,	३६ हिंग	२० ,,
१७ सेंधा नमक	१६० ,,	३७ जायफल	२० ,,
१८ देशी नमक	८० ,,	३८ दाल चीनी	२० ,,
१९ रगतरोड़ा	८० ,,	३९ संचोरा	४० ,,
२० मेथी	२०० ,,	४० ब्रह्मी	४० ,,
२१ गिरदान	४० ,,	४१ घुड़वच	८० ,,
२२ असगन्ध	२४० ,,	४२ हाथी पगा	८० ,,
२३ भंग	४० ,,	४३ काला कूड़ा	८० ,,
२४ खसखस	१६० ,,	४४ कायफल	२० ,,
२५ सप्तपर्ण पत्ते	८० ,,	४५ सांभर बेला	८० ,,
२६ कालीजीरी	१६० ,,	४६ बाल के बीज	८० ,,
२७ कड़वी काचरी	१६० ,,	४७ पुनरुनवा	८० ,,
२८ नागौरी असगन्ध	२४० ,,	४८ सुरजेना के बीज	८० ,,
२९ गटार	४० ,,	४९ डिकामाली	८० ,,
३० काली मिर्च	४० ,,	५० नीमगिलोय	१२० ,,

उपर्युक्त सब वस्तुओं को वारीक पीस कर किसी चर्तन में रख लेना चाहिए और आवश्यकतानुसार उपयोग में लाना चाहिए । यह चूर्ण किसी भी बीमारी में दिया जा सकता है । मात्रा जानवर की हालत, उम्र और ऋतु के अनुसार लेना चाहिए । साधारण तया २० तोला से ४० तोला तक दे सकते हैं । इसको जहाँ तक बन सके गर्म पानी के साथ ही देना चाहिए ।



## नासूर

आँवला १ तोला

कौड़ी १ तोला

नीला थोथा १ तोला

आँवला तथा कौड़ी को जलाकर खाख कर लेना—पश्चात् उसमें ३ तोला नीला थोथा मिलाकर उसमें घी मिला देना ।

इस को गरम करके नासूर में भर देना ।

## जानवर के कीड़े पड़ जाने पर

मकड़ी का जाला १

कागज सफेद १

कगवल के बाल थोड़े

तीनों चीजें जलाकर रोटी में दे देने से कीड़े मर जाते हैं ।

## जानवर का एकदम अंधा हो जाना

बोची पर एक दाग आड़ा लगाकर कमर पर दाग लगाना—कूँख के ऊपर पिछले पैरों की चटखूरी के नीचे तथा खूरों के ऊपर आड़ा दागना चाहिए ।

इस काम में छतरी की काड़ी काम में लानी चाहिए ।

आँखों में नीत्र का रस ४-४ बूंद २-४ दिन तक डालना चाहिए ।

## जुलाब

पलाश के बीज

१० नग

अमलतास गुदा

१ तोला

दतूनी की जड़

२ तोला

नमक काला

३ तोला

पानी

३ सेर

सबको चारीक बांटना पानी उत्रालकर उसमें कुटी दवा डालना  
व ठंडा होने पर पिलाना ।

## बच्चे के मरने पर दूध का न देना

१. किलहरी २॥ तोला

गुड़ २० तोला

गुड़ के साथ कूटकर सुबह-शाम ६-७ दिन तक देना ।

२. अपामार्ग की जड़ १ नग

गुड़ ५ तोला

मिलाकर ५-७ रोज सुबह-शाम देना ।

३. जुईकंद २॥ तोला

गुड़ १० तोला

पीसकर गुड़ के साथ सुबह शाम ५-७ दिन तक देना ।

४. शेषमूली (न्हार काटा) जड़ १० तोला

गेहूँ या बाजरे का दलिया ८० तोला

गुड़ २० तोला

पकाकर उसमें तेल २० तोला डालकर या घी डालकर दस बारह  
दिन तक देना ।

५. असकंद २० तोला

गेहूँ या बाजरे का दलिया ८० तोला

गुड़ २० तोला

तेल या घी २० तोला

सबको पकाकर १०-१२ रोज देना ।

## आलू के पत्ते खाने पर विष

### इलाज

१. मेहंदी २॥ तोला

धनिया २॥ तोला

इनको कूटकर रातको ४० तोला पानी में कोरे मटके में गलाना चाहिए । शाम-सुबह गलाकर आराम होने तक देना ।

२. नीबू का रस आंख में शाम सुबह ४ बूंद डालना चाहिए ।

३. पानी का पोता उसके दिमाग पर रखना चाहिए ।

## अलासिया बरू या ज्वार की जड़ या पौधे का विष या खेजड़ा फली का विष

इसी बीमारी में जानवर को नशासा रहता है । खाना-पीना छोड़ देता है, जुगाली नहीं करता ।

### इलाज

गुड़ २० तोला

छाछ ४० तोला

इसको मिलाकर ४-४ घंटे से आराम होने तक देना ।

## सर्प की कैचुली खाने का विष

### इलाज

लाल मिर्च ४० तोला

सैधा नमक २० तोला

गुड़ ४० तोला

पीसकर लड्डू बनाकर दिनमें ३ मर्तबा देना । तीन दिन खिलाना । ऊपर बताई दवा का नुकसा ६ टाईम में देना याने कुल वजन सवा सेर होता है । तीन दिन के लिए ।

## गर्दन तोड़

गर्दन तोड़ में जानवर की गर्दन घूमती नहीं, अकड़ जाती है । खुलार रहता है, खाना पीना छोड़ देता है ।

### इलाज

१. घुड़वच	१० तोला
लहसन	२॥ तोला
गुड़	२० तोला

सब को कूटकर शाम-सुबह देना । आराम होने तक देना ।

२. दागना—जानवर के कान के छोर से गर्दन तक दोनों तरफ दाग देना ।

## सन्निपात का इलाज

१. अलासिया	२॥ तोला
घुड़वज	२॥ तोला
इन्द्रायण फल	२॥ तोला
काला नमक	८ तोला

पीसकर गरम पानी करके कुनकुना शाम सुबह आराम होने तक देना ।

२. दागना—जानवर के दोनों कूँखपर X X इस मुजब दाग देना व मुँहपर नककुरे के ऊपर आँड़ा लगाना व बोची पर भी—इस मुजब दाग लगाना ।

## सर्पिण्ड का खोखला निकलना

### इलाज

तेल व सिन्दूर मिलाकर गाढ़ा गाढ़ा लगाना और ऊपर वाला बांधकर पट्टी बांधना । पट्टी पर खोपरे का तेल मिलाकर लगाना ताकि मक्खी न बैठे ।

## चक्कर आने का इलाज

जानवर चक्कर खाकर गिर जाता है । यह बीमारी शुरुआत में वर्षा के नए पानी से पैदा होती है ।

### इलाज

१. चक्करदार चींटी जो जमीन पर चक्करदार बिल बनाती है उस जगह के बिल की चक्करवाली मिट्टी २॥ तोला  
पानी २० तोला

यह पानी में घोलकर छानकर पिला देना । ऐसा चार चार घंटे से देते रहना ।

दागना—दराती से नाक के ऊपर से लगाकर पूंछ तरफ से लेकर पीछे नाक तक ऐसा गोल पूरे शरीर का सर्कल लगाना ।

## चमारी पड़ने का इलाज

पहले नीम के उबले पानी से घोंना बाद में

(१) अमचूल का तेल २ तोला

सर्पिण्डराज

सर्पिण्डराज को पीस कर अमचूल तेल में मिलाकर गरम करना । मिलाने पर लगाना, अगर जखम होगी तो भर जायगी ।

- (२) नील कपड़े में लगाने की व साबुन में मिलाकर लगाना ।
- (३) मेंहंदी मक्खन में मिलाकर लगाना ।
- (४) स्तनजोत का दूध लगाना ।

## स्तन से खून आना

### इलाज

- (१) पीले फूल की बूटी      २॥ तोला  
पानी                              २०      ,,

पीस कर पानी में मिलाकर पिलाना या गुड़ के साथ भी दे सकते हैं ।  
गुड़ तोला २० में दे सकते हैं ।

(२) तवे पर आग लेकर उसमें जिस स्तन से खून आता हो  
उसकी धार मारना ।

(३) खून आने वाले स्तन पर कंधी फिराना ।

(४) औंधा जूता करके उस पर स्तन की धार मारना ।

(५) हनुमान की चढ़ी सिंदूर लाकर धूनी देना ।

(६) नीम के उवाले हुए पानी को कुनकुना होने पर उसमें नमक  
मिलाकर शाम-सुबह सेकना ।

(७) घी या मक्खन में डीकामाली मिलाकर लगाना ।

## आर पिरानी आदि से नस में छेद होना

### इलाज

- (१) दही                                      ८० तोला  
मसूर दाल जली हुई      २०      ,,

मिलाकर दिनमें तीन मर्तबा पानीमें मिलाकर एकजीव करके पिलाना ।

नोट:— जिस जानवर का पांव टूट जाय व कहीं भी चोट लगने से खून बंद न हो तो उपर्युक्त दवा पिलाने से खून गाढ़ा होकर बंद होता है।

## आँख में चर्मिया पड़ जाना

### इलाज

- |          |         |
|----------|---------|
| (१) चूना | ३ रत्ती |
| तंत्राखू | ३ तोला  |
| नमक काला | ३ ,     |
| पानी     | ४० ,    |

संघको बारीक पीस कर उबाल कर छान लें बाद में कुनकुने आँख में छीटे दें।

## जीभपर छाले पड़ जाना

### इलाज

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| (१) बच्छांग की जड़ | २ तोला  |
| घी                 | १० तोला |

जड़ पीस कर घी में पिलाना।

## बांझपन दूर करना

बांझ गाय हमेशा फूलती रहती है मगर गर्भ नहीं रहता है।

(१) गाय को फूलते ही उसको करीब २-३ दफे उलटी गुलाब सावधानी से देना ताकि उसे कहीं चोट न आवे।

(२) बाद उसे नीचे लिखी दवा पिलाना

- |              |         |
|--------------|---------|
| पीली मिट्टी  | २ तोला  |
| केले का पानी | २० तोला |
| सिन्दूर      | ३ रत्ती |

मिलाकर छानकर पिलाना।

(३) बाद २ घंटे के बाद उसे

गोबर ..... २० तोला

पानी ..... ८० तोला

मिलाकर पिलाना

(४) उसे कैचा तान कर बांधना ताकि २४ घंटे तक बैठ न सके ।  
पानी पिलाते रहें । २४ घंटे खाना न दें ।

## लोहा खाजाने पर

जानवर लोहा खाजाय तो वह दिनों-दिन सूखता जाता है ।

### इलाज

(१) लोहा गाल झाड़ की अंतर छाल ४० तोला

पानी ..... ८० तोला

बारीक पीस कर छानकर पिलाना ।

### लोहा गाल झाड़ की पहिचान

झाड़ के अंदर अगर लोहा गाड़ दिया जाय तो वह गल जायगा  
कुछ रोज में इसे पहिचाना जाता है ।

(२) लोह चुंवक शरीर पर से हररोज उतारना ।

## पांव की करवान का इलाज

(१) नीम की पत्ती के उवाले हुए पानी में नमक डालकर सेकना ।

(२) कंठे जलाकर अच्छे जलने के बाद जमीन पर से आग  
हटाना व उस गरम जमीन पर पानी डालकर जानवर का करवान पांघ  
रखवाना ।



## कुछ रोगों की नामावली

—७१७—

१. चेचक, शीतलामाता.	Rinderpest
२. शीव ज्वर डेरीदाडोना.	Diarrhoea of Rinderpest
३. गल घोटु.	Haemorrhagic Septi- caemia
४. मुंह खुरी, खुरसाडा.	Foot & Mouth Disease
५. गर्भपात.	Abortion
६. चनुर्वात.	Tetanus
७. जहर वात.	Bovine Surra
८. खुजली.	Mange
९. खोडा.	Ringworm
१०. पेट फूलना.	Tympany
११. पेट का दर्द.	Colic
१२. अपचन.	Indigestion
१३. पेट में कीड़े पडना	Sustistinal Worm
१४. पेशित.	Dysentery
१५. दस्त भगने से लगना.	Diarrhoes
१६. पेशाव से खून जाना.	Hæmaturia
१७. पेशाव रुक जाना.	Retention of Urine
१८. जुकाम.	Wounds
१९. बुखार.	Fever
२०. निमोनिया.	Pheumonia
२१. खासी ढासना.	Cough
२२. दमा.	Asthama
२३. मुंह में काटे बढना.	Stematitis

२४. शीत पित्त, पित्ती उछलना.	Epilepsy
२५. मिरगी, म्रिगी.	Fits
२६. वित्व, तिवा.	Tiwa (Ephimeral Fever)
२७. कमेडी.	Cancer of Horn
२८. खटामी.	Parclitid Abscesses
२९. खूर का रोग.	Parpocatan of the...?
३०. डेंड का रोग.	Cancer of throat
३१. ईल रोग.	Cancer of Tongue
३२. पटाडी रोग.	Diarrhoea
३३. हिया विलाई.	Cocceidiosis
३४. तिड रोग. तिड्डू.	Filaria Haemorrhagica.
३५. फांसी रोग, छड रोग.	Anthra
३६. पूंछ का बांडी रोग.	Gangrene of tail
३७. आंख का फूला.	Conjunctivitis
३८. आंख में खून जमना.	Worms in Eye
३९. आंख का कोया निकालना.	Injury in Eye
४०. रतौघ आना.	Night Blindness
४१. हाथी पगा	Elephantiasis
४२. बच्चा गिरा देना.	Abortion(s)
४३. जेर न गिरना.	Retention of placenta
४४. धनदाह, धन का सूजना.	Mammitis
४५. बच्चेदानी का निकलना, फूल निकलना.	Prolapse of uterus
४६. गर्भधारण नहीं करना.	Sterility
४७. बार बार संयोग होनेपर भी गर्भ न रहना.	Contagious Abortion
४८. रक्तप्रदर.	Vaginitis
४९. माता का बच्चे को भूलना.	Cow forgets its calf
५०. हड्डी पर चोट लगना व टूटना	Fracture compound

५१. हड्डीका टूट कर बाहर आ जाना Communicatal compound Fracture.

५२. झटका लगना. Sprain

५३. पसली टूटना. Fracture of rib

५४. हड्डी का जोड़ से सरकना, Dislocation of Joint.  
तथा मोच आना.

५५. कमर टूटना. Fracture of Pelvic Bone

५६. आगेकी पैर की डांकली Dislocation of shoulder  
खिसकना. Joint

५७. खुर मोच, खुर खिसकना. Cracked Hoof

५८. सींग टूट जाना. Fracture of horn

५९. कंवे में गांठ होना. Yoke gall

६०. कंवा तिडकना. Yoke Prond flesh

६१. अकड़ जाना. Rheumatism

६२. गठिया या जोड़ों का दर्द. Owelling of Joints

६३. धन फटना. Wound on teat

६४. धन पर फुंसियां होना. Variola (Cow Pox)

६५. दूध पीते बच्चे को दस्त लगना. Diarrhoeas in Calves

६६. पागल कुत्ते, सियार आदि का Rabas-Anti-Rabic  
काटना.

६७. कमजोर सांड को बलवान बनाना Debility of Bull

६८. गर्मपानी. Durns or scalds

६९. नजर लगना. Evil Eye effect

७०. सांप, दिवड आदि का काटना. Snake bite

७१. शेर के नाखून आदि का विष पर Wound by tiger

७२. वरं, भंवर, मधुमक्खी का विष. Poison of insects

७३. दूध बढ़ाना. To increase the  
quantity of Milk

७४. जह्म का पकना. Performation in the wound

७५. जूवा पडना.	Lice infection
७६. आग से जलना.	Warts
७७. नासूर.	Ulcer
७८. कीड़े पड जाना.	Wound with maggots
७९. अंधा हो जाना.	Blindness
८०. खुर पकना.	Purgative
८१. बच्चे के मरने पर दूध न देना.	Agalactic (after the death of calf)
८२. आलू के पत्ते खाने पर विष.	Poisoning by Potato leaves
८३. जूवार के पीछे खाने पर विष.	Poisoning by Jwar leaves (Hydrocyanic Poisoning)
	Sorghum Vulgare stunted with draught.
८४. जेर खा लेना.	Eating of After births (Lacuta)
८५. स्वास्थ्य बनाये रखना.	Keeping the condition of Animal
८६. सर्प की केचुली खाने का विष.	Poisoning by Snake skin shedding
८७. गर्दनतोड़.	Meningitis
८८. तन्निपात.	Delirium
८९. सींग की खोल निकलना.	Horn care if removed by accident
९०. चक्कर आना.	Epilepsy x 24
९१. चमारी पडना.	Inflamed neck
९२. स्तन से खून आना.	Blood from teats
९३. आर पिराने आदि से नस में छेद होना.	Haemorrhage

२४. गंज से बाल उड़ जाना.	Decomposition
२५. आंख में चिमियां पड़ जाना.	Filaria Lachrymalis
२६. जीभ पर छाले पड़ना.	Stomatitis
२७. इच्छानुसार बछड़ा वा बछड़ी लेना.	Influence on breeding a particular sex
२८. खुर बढ़ना.	Sterility (See No. 46).
२९. लोहा खाने पर इलाज.	Eating of iron nails wires.
१००. पांव दलवाना.	Bruised Sole
१०१. अलसी का गुना खाने पर.	Poisoning by linseed
१०२. उलटी होना.	Vomiting
१०३. मस्सा होना.	Canker.

---

## कुछ दवाइयों की नामावली

हिन्दी	मराठी	अंग्रेजी
१. मद्रीका	मालकांगणी	Abutilon Indicum
२.	उत्तरणी	Deamia Extensa
३. घतूरा		Datura Innoxia
४. तिनच	तिवस	Ougcinia Dalbergioides
५. खेजड़ा	हिवर	Acacia Leucophloea
६. अघाड़ा, आंझीझाड़ा, अघाड़ा अपामार्ग		Achyranthes Aspera
७. सिनझिनी	चिलहाटी	Taesalpinia Sepiaria
८. सिसम	सिसम	Dalbergia Sissoo
९. मुंजाल		Mitragyna Parviflora
१०. दितुनी	दाती	Baliospermum Ascillare
११. रत्नज्योति	चन्द्रज्योति	Jatropha Gorsypifolia
१२. खांकरा, पलास, ढांकवेला		Butea Frondosa
१३. पुनरनमां, पुंगली		Boerhaavia Repanda
१४. कुवाडिया	तरोटा	Cassiatora
१५. चम्पा थूहर	निवडूंग	Euphorbia S. P.
१६. सीताफल		(Acrid Principles) Anona Squamosa
१७. सांवरवेला		Lettisomia Setosa
१८. अमलतास	भावा की फली	Cassia Fistula
१९. सूर्यवल्ली	रान वटाना	Chrozophora Plicata
२०. अेरडीं	अेरडीं	Recinus Communis
२१. सत्यनाशी घथुरा	पड्डी	Argemone Mexicana
२२. महुवा	मोहों	Bassia Lalifolia

२३. गवारपाठा,	कालीची का	Aloe-Vera
गृहनकुमारी	पान	
२४. खाकर वेली		Rlayuchosia Ruininra
२५. आकंडा, मल्हार	रुई	May be
		(Calotropis Gigantea)
२६. वेवची	वावची	Psoralia Corylifolia
२७. विलायती सर्या-	पड्डी	May be
नाशी घतुरा		(Argenione Mexicana)
२८. मेढा पाती		Levcas Aspera
२९. अरनी	टाकल	Cbrodmndron Phlomidcs
३०. वकान	वकान	May be Melia Sq.
३१. हुलहुल	खापरखुंटी	Hemigraplus Dura
३२. कंवर मोढी	कंवर मोढी	Tridar Procumbens
३३. हत्ती सूंडी		Heliotrrpum Supinum
३४. सालवैठनीया	कोला का	Lepidogathis Cristata
	आंड	
३५. हजारी गेन्दा	रानझंडू	Leonotis Uepetae Folia
३६. वेवची	वावची	P. Corylifolia
३७. सूरजना	मंगना	Moringa Pterygosperina
३८. खाकर वेली		R. Minima
३९. करमंदी	करमंदी	Gumuospona Kottieana
४०. उन्दाफूली, पानाचोली		Tricbodesmazey lanicum

# कुछ रोग तथा उनके उपचारोपयोगी औषधि

## बीमारी का नाम

## दवाई

१. हड्डी टूटने का इलाज  
तिनज की अंतर छाल और गाय का मूत्र ।
२. जेर वात की दवाई  
हुलहुल, सत्यानाशी, औरगुड ।
३. शीतमें आने की बीमारी  
घुडवच्छ, गजलन, कालीजीरी, गुड, निमक, लसन और पानी ।
४. पैर मोच खाने की दवा  
मुंजाल की पत्ती, नमक, पानी ।
५. आंखों में फूला पड़ने की दवा  
सांभरकासिंग, भिक्खन, कामिया सिंदूर, निबू का रस ।
६. हांसने की बीमारी की दवा  
साल के छिलके, या बूने का पानी ।
७. आंखों में फूल हो जाय उसकी दवा  
चंपा थूअर का दूधकनपटी में लगाना ।
८. सुर की दवा  
सेमल की रुई और मक्कन का मिला सिंदूर, भरना
९. नजर  
सुन्दर देल खिलाना, बहेदे परोले लेकर गले में बांधना
१०. दूध पीते बच्चे को छुड़ाना  
सोर के अंडो का छिलका, दही और नमक
११. डेडकी  
नमक और मिस्सी
१२. खोडा  
जला हुआ तेल और अन्नगंध, कुरंज का तेल
१३. जुलाब  
दित्तोनीकी जड़, पलास के बांज अमलतास की फली
१४. पडाडी  
नीम की पत्ती, घा, अरुणी की पत्ती



१५. माता, चेचक  
 १६. वेल को झटका लगाना  
 १७. दाफड  
 १८. जेर नहीं डालने की दवा  
 १९. पींग टूटना  
 २०. पींग टूट जाने से  
 २१. झक्कर  
 २२. घन में खून आने की दवा  
 २३. वेल को कंधे में गांठ पड जाय  
 २४. खुरसाडे की बीमारी से मसेहोना  
 २५. मवेशी की वच्चेदानी निकलना  
 २६. खून रोकने के उपाय  
 २७. हाती पगा की विमारी  
 २८. टट्टी लगना  
 २९. जल जानेपर  
 ३०. मुंह में कांटे होना  
 ३१. कमेडी लग जाय  
 ३२. खुरसाडा  
 ३३. खाज की दवा  
 ३४. बादल की बीमारी
- हस्ती सूंडी पानी के साथ  
 फिटकरी, आंवाहळदी, सज्जी,  
 काला नमक मेथी दाना और  
 छांछ  
 सरसों का तेल और नमक  
 फेफर की पत्ती, गुड और पानी  
 वेल का गीर, सिद्धूर, मीठा  
 तेल, सिद्धूर, और वबूल का गोंद  
 चीटियों की माटी और पानी  
 नीमकी पत्ती, नमक, पानी  
 छिटकना  
 आंकडे की जड रोटी में खिलावे  
 चितावल की जड, चूना, सज्जी,  
 तमाखू, नीला थोथा  
 धी, काली मिर्च, गुडवेल, सांभर  
 वेल, नीला थोथा  
 मसूर की दाल और दही  
 कान काटकर आंखमें खून आंजना  
 मरोड फली, शहा जीरा, और छांछ  
 अलसी का तेल, चूने का पानी,  
 राल  
 मक्खन, हलदी कैची से काटकर  
 लगाना  
 सोमल, भूरी रींगणि  
 सिद्धूर और तेल, आंकडे का दूध  
 गंधक, मैसल, भिलावा और धी  
 अलसीया वांट पानी में पिलाना

३५. नजर

३६. खूर में कीड़ा लगना या सड़ना

३७. दिवड के काटने या चाटने की दवा

३८. गर्भ गिरने से बचाना

३९. गाय या जानवर को शेर पकड़ले

४०. बैलों को टट्टी लगाने से

४१. आलू के पत्ते खा लेवे तो दवा

४२. भंवरे काट खावे तो

४३. कंधा तिडकने पर

४४. कंठ की बीमारी

४५. वदहजमी की दवा

४६. सांप की कँचुली खानेसे टट्टी  
लगती है व गोबर में गंध आती है

४७. दूध बढ़ाने की तरकीब

४८. इल की बीमारी

४९. अकड़ने की बीमारी

५०. थन कट जाने की दवा

आंधी झांडे की जड़ रोटी में देना

चूना, सीताफल की पत्ती बांध देना

शिवलिंगी बांट पानी में देना

शिवलिंगी के बीज देना

किरकिडिया की पत्ती

छांछवगारा, जलोहूआ ज्वार

और छांछ

मेहंसी और बनीया

गंवार पाठा रगड़ना गूदा

गघापलास की लकड़ी जलाकर

मक्खन के साथ लगाना

कांसला बटकर पानी में पिलाना

गेहूँ, काला निमक,

लाल मिर्च आधा शेर, पावसेर

सैंधा नमक, पीसकर १ लड्डू

३ बार में खिलाना

नहार कांटा या सेससूल की जड़

खिलाने से

मनुष्य के मांसे के बाल में गुठ

मिलाकर बंदूक के गरम गज से

टिकियाको जलमपर लगाना

गुराड की छाल को लेकर उबाल-

कर ४ बार देना

चारे का कोष्ठा छीलकर सुखाना

बाद में जलाकर मक्खन में मिला-

कर लगाना

५१. थल में फुन्सी हो जाना  
मक्खन में हल्दी तमक मिलाकर  
लगाना
५२. हिया बीलाय की विमारी पर  
वदक का अंडा और दूध मिला-  
कर पिगाना
५३. जल जाने से गोडे सूजते हैं  
साभर बेला, गिरदान, काला  
कुडा, नागोरी
५४. बेल के पेशाब में खून  
गेदा आधा सेर पानी में धोलकर  
पिलाना
५५. तिड की दवाई  
घृत और कांदे, कोसटा
५६. ताकत की दवाई  
तेल और शक्कर
५७. दूध पीते बच्चे को टट्टी लगना  
घृत और काली मिर्च
५८. खुरसाड़ा  
पिचकारी द्वारा खरगोश का खून  
निकालकर २० से ३० तोले खाने  
के तेल में एक या दो बूंद खून को  
डाल पिला देना



# गांधी अध्ययन केन्द्र

---

तिथि	तिथि
------	------

गांधी अध्ययन केन्द्र, जयपुर

पुस्तक रजिस्टर

संख्या २७२

विषयानुक्रम

संख्या १०/८